



مركز الإحصاء
STATISTICS CENTRE

إحصاءات
الصحة
2012

أصدر في ديسمبر 2012
الرقم المرجعي : SPS.04.P1

الفهرس

1	مقدّمة
2	الإحصاءات الأساسية للصحة خلال عام 2012
2	جدول 1: الإحصاءات الأساسية للصحة 2012
2	المنشآت الصحية
3	الخدمات الصحية حسب المنطقة
4	المستشفيات حسب المنطقة والقطاع
4	السلاسل الزمنية للمرافق الصحيّة و الأسرة منذ عام 1973 إلى عام 2012
4	معدّل استخدام الأسرة والمرضى النزلاء في المستشفيات الحكومية، 2012
5	الكوادر الطبية، 2008-2012
5	مجموع الكوادر الطبية (لكل 100,000 من السكان)، 2011 و 2012
6	المرضى، 2012
7	أسباب الوفاة، 2012
7	الوفيات حسب سبب الوفاة، 2005-2012
8	الوفيات حسب سبب الوفاة والفئات العمرية، 2012
9	معدّل الوفيات حسب سبب الوفاة والجنسية والنوع
9	معدل الوفاة (لكل 100,000 من السكان) حسب النوع والجنسية، 2012
11	معدّلات الوفاة حسب سبب الوفاة والجنسية وفئات العمر
12	معدّلات وفيات السرطان من 2009 إلى 2012
13	الأمراض المعدية، 2012
13	الأمراض المعدية حسب نوع المرض والجنسية والفئة العمرية، 2012
14	معدّل الإصابة بالأمراض المعدية (لكل 100,000 من السكان) حسب نوع المرض والجنسية والفئات العمرية، 2012
16	إخطارات الأمراض المعدية
17	التبرّع بالدم
18	الجدول الإحصائية
46	الملاحظات التوضيحية
47	الملاحظات الفنية

مقدّمة

ينصّ دستور منظمة الصحة العالمية على أن "التمتّع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان" لذا تولي إمارة أبوظبي تحسين نوعية حياة المواطنين اهتماماً كبيراً، وذلك بتسخير الموارد ورسم الخطط والاستراتيجيات التي من شأنها أن تضمن عناية صحية فائقة في الإمارة.

ينتشر مركز الإحصاء - أبوظبي بتقديم إحصاءات الصحة لإمارة أبوظبي خلال عام 2012 لصانعي القرار والسياسات، والمهنيين والباحثين وجميع المهتمين بالأرقام الإحصائية والمؤشرات الاجتماعية.

يبدأ الإصدار بموجز عن أهم الملاحظات الموجودة في الإحصاءات بحيث يقدّم هذا القسم ملخصاً للإحصاءات الرئيسية والنتائج المتعلقة بالمنشآت الصحية، وأرقام المرضى، والأطباء، والوقاية الصحية، ومعدّلات الوفاة وأسبابها. وسعيّاً من المركز إلى مواصلة تطوير العمل الإحصائي وتقديم إحصاءات تغطي أغلب الجوانب الخاصة بالصحة، فقد تمّ تزويد هذا الإصدار بمؤشرات عن وفيات السرطان.

ويقدّم القسم الثاني مجموعة من الجداول التفصيلية لأولئك الذين يرغبون في رؤية الأرقام التفصيلية المتعلقة بكل موضوع من الموضوعات الواردة في الإصدار. وقد تمّت إضافة سلسلة زمنية أطول من الإحصاءات الأساسية، حال توافرها.

ويوفر فصل الملاحظات التوضيحية في نهاية الإصدار شرحاً للمصطلحات والمفاهيم الفنية المستخدمة فيه، ونصح السادة القراء بمطالعة هذا الفصل في أثناء قراءة البيانات والإحصاءات الواردة في النشرة.

وكعهد المركز دوماً نوّد أن نعبر عن وافر الامتنان لشركائنا الاستراتيجيين كافة، الذين لم يدّخروا جهداً لكي نتمكّن من إصدار نشرات موثوق بها. وفي هذا الصدد نتوجّه بخالص الشكر إلى هيئة الصحة - أبوظبي ووزارة الصحة على دعميهما الكبيرين من خلال توفير البيانات للمركز.

الإحصاءات الأساسية للصحة خلال عام 2012

يلخص الجدول التالي الإحصاءات الرئيسية لقطاع الصحة في إمارة أبوظبي خلال عام 2012.

جدول 1: الإحصاءات الأساسية للصحة 2012

39	المستشفيات
4,226	أسرة المستشفيات
1.8	الأسرة لكل 1,000 من السكان
540	المراكز الصحية
316	العيادات
454	الصيدليات
5,528	الأطباء
2.4	الأطباء لكل 1,000 من السكان
12,375	الممرضات
5.3	الممرضات لكل 1,000 من السكان
969	الأسنان
0.4	أطباء الأسنان لكل 1,000 من السكان

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي، هيئة الصحة - أبوظبي.

المنشآت الصحية


يوضح الجدول (2) عدد المنشآت الصحية في إمارة أبوظبي حسب المنطقة خلال الفترة من 2008 إلى 2012. نظراً إلى إعادة تصنيف مستشفيات جراحة اليوم الواحد لفئة المراكز الصحية، انخفض عدد المستشفيات من 39 مستشفى في عام 2008 إلى 35 في عام 2011.

وارتفع عدد المستشفيات خلال عام 2012 ليلغ 39 حيث تم افتتاح ثلاثة مستشفيات جديدة في منطقة أبوظبي ومستشفى واحد في منطقة العين.

وارتفع عدد أسرة المستشفيات من 3,546 سريراً خلال عام 2008 إلى 4,226 سريراً خلال عام 2012. كما ارتفع عدد المراكز الصحية من 386 مركزاً في عام 2008 إلى 540 مركزاً خلال عام 2012، وزاد عدد العيادات هو الآخر من 196 عيادة في عام 2008 إلى 316 عيادة في عام 2012.

ويعكس الشكل (1) الزيادة التي حدثت في المنشآت الصحية في إمارة أبوظبي. وتشير البيانات إلى ارتفاع أعداد المراكز الصحية والعيادات بشكل كبير منذ عام 2007 حتى عام 2012.

الشكل 1: عدد المستشفيات، المراكز الصحية والعيادات في إمارة أبوظبي، 2007 - 2012




المصدر: مركز الإحصاء- أبوظبي، هيئة الصحة - أبوظبي.

الخدمات الصحية حسب المنطقة


يبين جدول (2) توزيع الخدمات الصحية حسب تصنيف الخدمات الصحية لمناطق إمارة أبوظبي خلال الأعوام من 2008 إلى 2012. ويظهر الجدول النمو الكبير في عدد الخدمات الصحية المصنفة "مراكز صحية" وذلك في مناطق الإمارة كافة على مدى الأعوام الخمسة الماضية. شهدت منطقة أبوظبي أكبر نمو في عدد المراكز الصحية بزيادة بلغت 99 مركزاً صحياً خلال الفترة من 2008 إلى 2012، في حين شهدت الغربية أكبر نسبة ارتفاع حيث زاد عدد المراكز الصحية من 5 إلى 26 مركزاً خلال الفترة من 2008 إلى 2012، بزيادة مقدارها 420%.

وقد ارتفع عدد العيادات في منطقة أبوظبي من 125 عيادة في عام 2008 إلى 204 عيادات في عام 2012، وفي منطقة العين من 66 عيادة خلال عام 2008 إلى 100 عيادة في عام 2012. وفي الفترة نفسها حدث انخفاض في عدد المستشفيات في منطقة أبوظبي، حيث انخفض العدد من 22 مستشفى في عام 2008 إلى 19 مستشفى في عام 2012، وعاد الرقم إلى الارتفاع مرة أخرى في عام 2012 ليصل إلى 22.

الشكل 2ب: عدد المستشفيات، المراكز الصحية والعيادات حسب المنطقة، 2012



الشكل 2أ: عدد المستشفيات، المراكز الصحية والعيادات حسب المنطقة، 2011



المصدر: مركز الإحصاء- أبوظبي، هيئة الصحة - أبوظبي.

المستشفيات حسب المنطقة والقطاع

يقدم الجدول (3) عرضاً مفصلاً للمستشفيات حسب المنطقة والقطاع خلال الفترة ما بين 2008 و2012. ويبيّن الجدول أنّ المستشفيات الخاصة هي الأكثر انتشاراً وشيوعاً في منطقة أبوظبي، حيث بلغت 17 مستشفى في عام 2012.

علاوة على ذلك، يوضّح الجدول أنّ العدد الإجمالي للمستشفيات انخفض بمقدار 4 مستشفيات خلال الفترة بين 2008 و2012 إلا أن عام 2012 شهد زيادة مقدارها أربعة مستشفيات. ويرجع انخفاض العدد الإجمالي للمستشفيات إلى التغيّرات التي حدثت في عدد المستشفيات الخاصة كنتيجة لعملية إعادة التصنيف، حيث انخفض العدد من 25 مستشفى خلال عام 2008 إلى 21 في عام 2011.

وارتفع عدد المستشفيات الخاصة من 21 في عام 2011 إلى 25 في عام 2012، حيث تمّ افتتاح ثلاثة مستشفيات خاصة جديدة في منطقة أبوظبي وواحدة في منطقة العين.


السلاسل الزمنية للمرافق الصحيّة و الأسرة منذ عام 1973 إلى عام 2012

يبيّن جدول (4) عدد المستشفيات الحكومية والعيادات والأسرّة المتاحة لكل 1,000 من السكان في إمارة أبوظبي خلال الفترة ما بين عام 1973 و عام 2012. ويعكس الجدول النمو السريع في مدى توافر الخدمات، بما في ذلك زيادة بلغت 453% في عدد الأسرّة المتوافرة في المستشفيات الحكومية خلال الفترة الواقعة ما بين عامي 1973 و2012.


معدّل استخدام الأسرّة والمرضى النزل في المستشفيات الحكومية، 2012

يشير جدول (5) إلى وجود تباين بين المناطق فيما يخصّ عدد المرضى لكل سرير، حيث تفاوت الرقم بين 20 مريضاً لكل سرير بين الغربية التي بلغت 23 مريضاً لكل سرير ومنطقة العين التي بلغت 44 مريضاً لكل سرير، وذلك على الرغم من وجود اختلافات كبيرة في أعداد الأسرّة بين كلا المنطقتين، إذ يبلغ عدد الأسرّة في منطقة العين 837 سريراً فيما يقف الرقم عند 262 سريراً في الغربية.

الشكل 3ب: المرضى النزل في المستشفيات الحكومية حسب المنطقة، 2011 و 2012



الشكل 3أ: المرضى النزل في المستشفيات الحكومية حسب المنطقة، 2011 و 2012



المصدر: مركز الإحصاء- أبوظبي، هيئة الصحة - أبوظبي.

الكوادر الطبية، 2012-2008

ويبين جدول (6) عدد الكوادر الطبية في إمارة أبوظبي خلال الفترة من 2008 إلى 2012. ويُظهر الجدول أنّ عدد الأطباء قد انخفض بشكل عام من 312 طبيباً لكل 100,000 من السكان خلال عام 2008 إلى 237 طبيباً لكل 100,000 من السكان في عام 2012. وعلى المنوال نفسه، انخفض عدد أطباء الأسنان من 49 طبيباً لكل 100,000 من السكان في عام 2008 إلى 42 طبيباً لكل 100,000 من السكان في عام 2012. وفي المقابل زاد عدد الممرضات من 406 ممرضات لكل 100,000 من السكان في 2008 إلى 530 ممرضة لكل 100,000 من السكان في عام 2012.


ويتمتع سكان منطقة أبوظبي إجمالاً بأكبر عدد من الطاقم الطبي بمعدّل يبلغ 911 مختصاً لكل 100,000 من السكان خلال عام 2012، تليها العين بفارق بسيط، حيث بلغ العدد 809 مختصين لكل 100,000 من السكان، بينما يبلغ المعدّل 292 مختصاً لكل 100,000 من السكان في الغربية. وشهد عام 2012 انخفاض عدد الكوادر الطبية إجمالاً بمقدار 62 مختصاً مقارنة بعام 2011.

مجموع الكوادر الطبية (لكل 100,000 من السكان)، 2011 و 2012


الكوادر الطبية	2011	2012
الأطباء	231	237
الممرضات	495	530
أطباء الأسنان	41	42

المصدر: مركز الإحصاء- أبوظبي، هيئة الصحة - أبوظبي.

الشكل 4ب: الممرضات لكل 100,000 من السكان حسب المنطقة، 2011 و 2012




الشكل 4أ: الأطباء لكل 100,000 من السكان حسب المنطقة، 2011 و 2012



المصدر: مركز الإحصاء- أبوظبي، هيئة الصحة - أبوظبي.

الشكل 4ج: أطباء الأسنان لكل 100,000 من السكان
حسب المنطقة، 2011 و 2012



المصدر: مركز الإحصاء- أبوظبي، هيئة الصحة - أبوظبي.

ويعرض جدول (7) بالتفصيل السلاسل الزمنية لعدد الكوادر الطبية خلال الفترة بين 1974 و 2012. وعلى الرغم من تغيير الأرقام بشكل متقطع، فإن السلاسل الزمنية تشير إلى نمو كبير في عدد العاملين في مجال الصحة خلال تلك الفترة. على سبيل المثال، زاد عدد الأطباء بما يقرب من 200% بين عامي 1984 و 2012، بينما زاد عدد الممرضات والمساعدات بنسبة تصل إلى نحو 147% خلال الفترة نفسها.

المرضى، 2012

يشير جدول (8) إلى أن عدد المرضى النزل في المستشفيات الحكومية خلال عام 2012 بلغ 96,700 مريض، فيما بلغ عدد المرضى في العيادات الخارجية 2,376,100 مريض. وتشير البيانات إلى أن الاختلافات في وتيرة المرضى النزل بين مناطق الإمارة الثلاث تتفق إلى حد ما مع توزيع السكان، حيث بلغت النسبة في منطقة أبوظبي 55.8%، تليها العين بنسبة 37.6%، والغربية بنسبة 6.5%. واختلفت نسب توزيع مرضى العيادات الخارجية حيث حققت منطقة العين زيادة بلغت 38.2%، وفي الغربية بلغت الزيادة 12.6%.


يشير الجدول إلى عدد المرضى الداخليين وعدد المرضى الخارجيين في مستشفيات إمارة أبوظبي الخاصة، حيث بلغ عدد المرضى النزل خلال عام 2012 ما يعادل 67,200، وقد شكّل المرضى النزل في مستشفيات خاصة في منطقة أبوظبي 73.1%. وفي عام 2012 بلغ عدد المرضى الخارجيين في المستشفيات الخاصة 3,740,600.

الحالات في المستشفيات الحكومية والخاصة، 2012


الحالات	المرضى الداخليين	مرضى العيادات الخارجية
مجموع الحالات	163,900	6,116,700
الحالات (حكومي)	96,700	2,376,100
الحالات (خاص)	67,200	3,740,600

المصدر: مركز الإحصاء- أبوظبي، هيئة الصحة - أبوظبي

الشكل 5ب: مرضى العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية والخاصة حسب المنطقة، 2012



الشكل 5أ: المرضى الداخليين في المستشفيات الحكومية والخاصة حسب المنطقة، 2012



المصدر: مركز الإحصاء- أبوظبي، هيئة الصحة - أبوظبي

أسباب الوفاة، 2012

يعرض جدول (9) معدّل الوفيات لكل 100,000 من السكان حسب الأسباب الأكثر شيوعاً للوفاة خلال عام 2012، وتأتي "أمراض القلب والأوعية الدموية" في المقدمة بمعدّل 48.6 حالة لكل 100,000 من السكان، وفي المرتبة الثانية جاءت "الأورام" بمعدّل 20.3 حالة لكل 100,000 من السكان، تلتها "الأسباب الخارجية للاعتلال والوفاة" بمعدّل 19.3 حالة لكل 100,000 من السكان.

وتزيد هذه الأسباب الثلاثة مجتمعة على أسباب الوفاة الأخرى كافة، وقد اتضح أن السبب الثاني وهو "الأورام" يحدث بمعدّل يزيد بأربعة أضعاف على السبب الرابع للوفاة وهو "أمراض الجهاز التنفسي" الذي يحدث بمعدّل 5.7 لكل 100,000 من السكان. وكما يتّضح من الجدول (10) تمثّل الأسباب الثلاثة الأكثر شيوعاً للوفاة ما يقارب 70% من أسباب الوفاة كافة.

الوفيات حسب سبب الوفاة، 2012-2005


يشير جدول (10) إلى التوزيع النسبي لأسباب الوفاة للفترة ما بين عامي 2005 و2012، حيث يقدّم الجدول عرضاً لأكثر أسباب الوفاة شيوعاً، كما يجمع الجدول الأسباب الأخرى التي كانت أقل من أن تعرض بشكل مستقل تحت بند "الأسباب الأخرى". ويشير الجدول إلى أن "أمراض القلب والأوعية الدموية" كانت دوماً أكثر الأسباب شيوعاً للوفيات فيما عدا عام 2005 حيث كانت مجموعة من "الأسباب الخارجية للاعتلال والوفاة، والإصابة، والتسمّم، وبعض الأسباب الخارجية الأخرى" هي أكثر أسباب الوفيات شيوعاً. وقد تم تقسيم هاتين الفئتين بعد عام 2005.

وقد اتضح خلال الفترة من 2005 إلى 2012 أن هناك نمواً مطرداً في نسبة الوفيات بسبب الأورام وقد ارتفعت تلك النسبة من 15.9% في عام 2011 إلى 16.2% في عام 2012.

ويبيّن جدول (11) نسبة الوفيات حسب الجنسية والنوع وسبب الوفاة لعام 2012. ويوضّح الجدول (11أ) النسب المئوية لأسباب الوفاة بين المواطنين، و(11ب) لغير المواطنين و(11ج) للمواطنين وغير المواطنين معاً حسب النوع.

تعدّ "أمراض القلب والأوعية الدموية" أكبر سبب للوفاة بالنسبة إلى المواطنين، حيث بلغت نسبة الذكور 36.2%، فيما بلغت نسبة الإناث 32.4%. وجاءت "أمراض القلب والأوعية الدموية" في المرتبة الثانية لأكثر أسباب الوفاة شيوفاً بين المواطنين بنسبة 15.4% للذكور، و20.7% للإناث. وبالنسبة إلى الذكور غير المواطنين مثّلت "الأورام" أكبر سبب للوفاة خلال عام 2012 بنسبة 45.5%، تليها "الأسباب الخارجية للاعتلال والوفاة" بنسبة 21.3% و"الأورام" بنسبة 11.4%. أما بالنسبة إلى الإناث غير المواطنين فقد كانت "الأورام" أكبر سبب للوفاة خلال عام 2012 بنسبة 30.5%، تليها "أمراض القلب والأوعية الدموية" بنسبة 28.1%، ثم "أعراض وعلامات وحالات غير عادية طبيياً ومعملياً وغير مصنّفة" بنسبة بلغت 7.7%.

الشكل 6 : الأسباب الرئيسية للوفاة، 2012




المصدر: مركز الإحصاء- أبوظبي، هيئة الصحة - أبوظبي.

الوفيات حسب سبب الوفاة والفئات العمرية، 2012

كانت "التشوّهات والعاهات والشذوذات الصبغوية (الكروموسوميّة) الخَلقيّة" السبب الأكثر شيوعاً للوفاة بين المواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 0 و14 عاماً خلال عام 2012 بنسبة 25.4%، أما للفئات العمرية 15-29 فكانت "الأسباب الخارجية للاعتلال والوفاة" بنسبة بلغت 51.9%. وجاءت "أمراض القلب والأوعية الدموية" كأكثر أسباب الوفاة شيوفاً بين الفئات العمرية 30-44 بنسبة 27.6%، والفئات العمرية 45-59 بنسبة 41.8%، والفئة العمرية 60 عاماً فأكثر بنسبة 41.8%.

أما أكثر الأسباب شيوعاً للوفيات بين غير المواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 0 و14 خلال عام 2012 فكانت "التشوّهات والعاهات والشذوذات الصبغوية (الكروموسوميّة) الخَلقيّة" بنسبة 22.4%، وتلا ذلك "بعض الحالات التي تنشأ في الفترة المحيطة بالولادة" بنسبة 21.8%. وجاءت "الأسباب الخارجية للاعتلال والوفاة" كأكثر أسباب الوفاة شيوفاً بين الفئات العمرية 15-29 بنسبة 45.2%. وكانت "أمراض القلب والأوعية الدموية" السبب الأكثر شيوعاً بالنسبة إلى الفئات العمرية 30-40 و45-59، وأكثر من 60 عاماً بنسب 47.7% و50.1% و41.3% على التوالي.

الشكل 7: إجمالي عدد الوفيات حسب الجنسية والعنصر العرقي، 2012



المصدر: مركز الإحصاء- أبوظبي، هيئة الصحة - أبوظبي.

معدّل الوفيات حسب سبب الوفاة والجنسية والنوع

ويُعرف معدّل الوفاة بسبب عامل معيّن خلال عام محدّد بأنه عدد الوفيات المرتبطة بهذا العامل لكل 100,000 من السكان خلال العام نفسه.

معدل الوفاة (لكل 100,000 من السكان) حسب النوع والجنسية، 2012

النوع	المواطنون	غير المواطنين
الإجمالي	204.7	104.7
الذكور	250.8	101.3
الإناث	152.8	114.9

المصدر: مركز الإحصاء- أبوظبي، هيئة الصحة - أبوظبي.

تشير مجموعة الجداول (13أ) و(13ب) و(13ج) إلى معدّل الوفيات عند المواطنين وغير المواطنين وكلاهما على التوالي. بلغ معدّل الوفيات الإجمالي لكل 100,000 من الذكور المواطنين خلال عام 2012 ما يعادل 250.8، وللذكور غير المواطنين 101.3، فيما بلغ معدّل الوفيات الإجمالي لكل 100,000 من الإناث المواطنات 152.8 ولغير المواطنات 114.9. ويلاحظ أن معدّل وفيات المواطنين الذكور حسب سبب الوفاة (لكل 100,000 من السكان) أعلى بكثير من نظيره عند غير المواطنين الذكور.

وكانت "أمراض الجهاز الدوري" أعلى سبب محدد للوفيات بين المواطنين الذكور في عام 2012 بمعدّل 90.9 حالة وفاة لكل 100,000 من السكان، تليها "الأسباب الخارجية للاعتلال والوفاة" بمعدّل 38.6 حالة وفاة لكل 100,000 من السكان، بعد ذلك جاءت "الأورام" بمعدّل 33.7 حالة وفاة لكل 100,000 من السكان، ثم "أمراض الجهاز التنفسي" بمعدّل 21.1 حالة وفاة لكل 100,000 من السكان، ثم "التشوّهات والعاهات والشذوذات


الصبغوية (الكروموسومية) الخَلقيّة" بمعدّل 10.1 حالة وفاة لكل 100,000 من السكان، وأخيراً بسبب العديد من عوامل الوفاة الأخرى ولكن بمستويات أقل.

وقد سجّل الذكور غير المواطنين نمطاً مماثلاً للمواطنين خلال عام 2012، إذ جاءت "أمراض الجهاز الدوري" كأكثر أسباب الوفاة شيوعاً بمعدّل 46.1 حالة وفاة لكل 100,000 من السكان، يليها "الأسباب الخارجية للاعتلال والوفاة" (21.5 حالة وفاة لكل 100,000 من السكان)، و"الأورام" (11.4 حالة وفاة لكل 100,000 من السكان)، و"أعراض وعلامات وحالات غير عادية طبيّاً ومعمليّاً وغير مصنّفة" (5.2 حالة وفاة لكل 100,000 من السكان)، و"إصابات وتسمّم وحالات أخرى معيّنة ناتجة لأسباب خارجية" (3.5 حالة وفاة لكل 100,000 من السكان)، وأخيراً بسبب العديد من عوامل الوفاة الأخرى ولكن بمستويات أقل.

وكانت "أمراض الجهاز الدوري" أكثر أسباب الوفاة شيوعاً بين المواطنين في عام 2012، بمعدّل بلغ 49.5 حالة وفاة لكل 100,000 من السكان، تليها "الأورام" بمعدّل 31.7 حالة وفاة لكل 100,000 من السكان، ثم جاء في المرتبة الثالثة كل من "الأسباب الخارجية للاعتلال والوفاة" و"أمراض الجهاز التنفسي" بمعدّل يبلغ 8.2 حالة وفاة لكل 100,000 من السكان لكل منهما على حدة، وأخيراً بسبب العديد من عوامل الوفاة الأخرى ولكن بمستويات أقل.

وتختلف معدّلات الوفاة للإناث غير المواطنين حسب سبب الوفاة في عام 2012 عن نظيراتها عند المواطنين، حيث تعدّ "الأورام" أكثر الأسباب شيوعاً بين الإناث غير المواطنين وبمعدّل 35.1 حالة وفاة لكل 100,000 من السكان، تلتها "أمراض الجهاز الدوري" بمعدّل 32.3 حالة وفاة لكل 100,000 من السكان، ثم "أعراض وعلامات وحالات غير عادية طبيّاً ومعمليّاً وغير مصنّفة" بمعدّل 8.8 حالة وفاة لكل 100,000 من السكان، وأخيراً بسبب العديد من عوامل الوفاة الأخرى ولكن بمستويات أقل.

الشكل 8: إجمالي معدل الوفيات (لكل 100,000 من السكان) حسب النوع والجنسية، 2012



المصدر: مركز الإحصاء- أبوظبي، هيئة الصحة - أبوظبي.

معدّلات الوفاة حسب سبب الوفاة والجنسية وفئات العمر

تبيّن مجموعة الجداول (14) معدّلات الأسباب الرئيسيّة للوفاة لكل 100,000 من السكان حسب الفئة العمرية للمواطنين في جدول (14أ)، وغير المواطنين (14ب) والمواطنين وغير المواطنين (14ج) خلال عام 2012.

ويوضّح الجدول (14أ) أن أكثر أسباب الوفاة شيوعاً بين الفئات العمرية ما بين 0 و14 عاماً هي "النقص والشذوذ الخلقي والتشوّه الخلقي والتشوّه الكروموسومي" بمعدّل 23.4 حالة لكل 100,000 من السكان، يلي ذلك "حالات معيّنة تنشأ في فترة ما قبل الولادة" بمعدّل 17.9 حالة لكل 100,000 من السكان. أما أكثر أسباب الوفاة شيوعاً بين الفئات العمرية 15-29 فكان "الأسباب الخارجية للاعتلال والوفاة" بمعدّل بلغ 78.3 لكل 100,000 من السكان، فيما كانت "أمراض الجهاز الدوري" أكثر أسباب الوفاة شيوعاً بين الفئة العمرية 30-44 بمعدّل يبلغ 30.3 لكل 100,000 من السكان وبين الفئة العمرية 45-59 بمعدّل (163.3 حالة لكل 100,000 من السكان) والفئة العمرية 60 عاماً فأكثر لكن بمعدّل أعلى بلغ 1206.3 حالة لكل 100,000 من السكان.

وبالنسبة إلى غير المواطنين في الفئة العمرية 0-14 كان "النقص والشذوذ الخلقي والتشوّه الخلقي والتشوّه الكروموسومي" هو السبب الأكثر شيوعاً للوفاة بمعدّل 17.9 لكل 100,000 من السكان، تلا ذلك "بعض الحالات التي تنشأ في الفترة المحيطة بالولادة" بمعدّل 17.4 لكل 100,000 من السكان. وكانت "الأسباب الخارجية للاعتلال والوفاة" أكثر عوامل الوفاة شيوعاً عند غير المواطنين في الفئات العمرية التي تتراوح بين 15 و29 بمعدّل بلغ 17.5 حالة لكل 100,000 من السكان. وجاءت "أمراض الجهاز الدوري" كأكثر الأسباب شيوعاً عند الفئات العمرية 30-44 و45-59 و60 عاماً فأكثر بمعدّل 30.1 و126.0 و751.0 حالة لكل 100,000 من السكان على التوالي.

معدّلات وفيات السرطان من 2009 إلى 2012

بيّن الجدول (15) معدّل وفيات السرطان لكل 100,000 من السكان حسب النوع والجنسية للأعوام من 2009 حتى 2012. وتشير البيانات إلى أن معدّلات الذكور انخفضت تدريجياً منذ عام 2009، في حين أن معدّلات الإناث ارتفعت خلال عامي 2009 و2010 ومن ثم انخفضت بعد ذلك في عام 2012.


انخفض المعدّل العام لوفيات السرطان لكل 100,000 من السكان من 23.7 حالة وفاة لكل 100,000 من السكان خلال عام 2009 إلى 22.7 حالة وفاة لكل 100,000 من السكان خلال عام 2010، ثم إلى 17.4 حالة وفاة لكل 100,000 من السكان في عام 2012.

يشير الجدول الخاص بالذكور إلى انخفاض سنوي تدريجي، حيث انخفض معدّل الذكور المواطنين من 41.7 حالة وفاة لكل 100,000 من السكان في عام 2009 إلى 30.4 لكل 100,000 من السكان في عام 2012، فيما انخفض معدّل الذكور غير المواطنين من 16.1 إلى 9.8 حالة وفاة لكل 100,000 من السكان.


وفيما يتعلّق بالإناث فقد ارتفعت جميع المعدّلات (المجموع، والمواطنات، وغير المواطنات) بين عامي 2009 و2010، وانخفضت هذه المعدّلات خلال العام التالي لتصل إلى 28.4 و26.5 و29.4 حالة لكل 100,000 من السكان على التوالي.

وعلى الرغم من أن أعلى معدّل لوفيات السرطان خلال الأعوام الثلاثة الماضية كان للمواطنات في عام 2010 بمعدّل 42.6 حالة وفاة لكل 100,000 من السكان، كان أكبر انخفاض للمجموعة نفسها أيضاً، إذ وصل المعدّل إلى 16.1 حالة وفاة لكل 100,000 من السكان في عام 2012، وهو يمثّل 26.5 حالة وفاة لكل 100,000 من السكان الإناث.

الشكل 9ب: معدل وفيات السرطان للإناث (لكل 100,000 من السكان) حسب الجنسية، 2010-2012



الشكل 9أ: معدل وفيات السرطان للذكور (لكل 100,000 من السكان) حسب الجنسية، 2010-2012



المصدر: مركز الإحصاء- أبوظبي، هيئة الصحة - أبوظبي.

الأمراض المعدية، 2012

تكتسب الأمراض المعدية أهمية متزايدة في جميع أنحاء العالم، سواء من حيث معدلات المرض أو الوفيات ويرجع ذلك إلى زيادة معدلات انتشار الأمراض المعدية، وظهور العديد من الأمراض الجديدة التي قد تؤدي إلى الوفاة، وبطبيعة الحال تحظى طرق الوقاية من تلك الأمراض بالمزيد من الأهمية.

الأمراض المعدية حسب نوع المرض والجنسية والفئة العمرية، 2012

تشير الجداول (16أ) و(16ب) و(16ج) إلى النسب المئوية لأنواع العدوى الأمراض المعدية حسب الفئة العمرية، بحيث يعرض الجدول الأول (16أ) نسب المواطنين، والجدول (16ب) غير المواطنين، والجدول (16ج) مجموع المواطنين وغير المواطنين.

وقد بلغ مجموع الحالات عند المواطنين خلال عام 2012 ما يعادل 5,145 حالة. وقد حقق "الجدري المائي" أعلى نسبة إصابة بين جميع الأمراض المعدية التي تم اكتشافها بين كل من المواطنين وغير المواطنين بنسبة بلغت 51.2% من إجمالي عدد الحالات. وجاءت "الملاريا" في المرتبة الثانية بنسبة بلغت نحو 14.1% من إجمالي الحالات.

وبعقد مقارنة بين المواطنين (16أ) وغير المواطنين (16ب) يتضح أن نمط توزيع العدوى بين الفئات العمرية مماثل بحيث تتناقص معدلات الإصابة عند التقدم في العمر، على الرغم من ارتفاع الإصابة بالجدري المائي بين المواطنين بشكل عام بنسبة بلغت 65.2% من الحالات مقابل 40.0% لغير المواطنين، ومع ذلك يعدّ الرقم الفعلي لغير المواطنين أعلى بكثير من نظيره بين المواطنين بسبب اختلاف حجم السكان، حيث تمّ تسجيل ما يقارب 6,515 حالة بين غير المواطنين مقارنة بما يقارب 3,356 بين المواطنين.

وجاءت "الملاريا" كثاني أعلى نسبة إصابة بالأمراض المعدية بين غير المواطنين بما يقارب 2,710 أشخاص وهو ما يمثل 16.6% من إجمالي حالات الإصابة بالأمراض المعدية، يلي ذلك "أنواع أخرى من التسمّم الغذائي" بنسبة 4.2%، ثم "الجرب" بنسبة 4.1%.

وعلى العكس، كانت حالات الملاريا طفيفة جداً بين المواطنين، وجاء "التسمّم الغذائي" كثاني أكبر نسبة إصابة خلال عام 2012 بنسبة بلغت 8.9% من جميع حالات العدوى بالأمراض المعدية وهو ما يعادل 460 شخصاً، ثم جاء "الالتهاب الكبدي الفيروسي ب" بنسبة 3.2% أو ما يعادل 164 حالة. وعلى الرغم من تقارب معدّل العدوى "بالالتهاب الكبدي الفيروسي ب" بين المواطنين ونظيره عند غير المواطنين (3.1)، فإنه يظهر في شريحة أكبر نظراً إلى تفاوت حجم السكان، حيث ظهرت 501 حالة عند غير المواطنين.

ومن حيث العدوى حسب الفئات العمرية المحددة يتضح أن "الجدري المائي" سجّل أعلى نسبة إصابة بين الفئة العمرية 0-14 بنسبة بلغت 73.8%، وجاء المرض نفسه كأعلى معدّل إصابة بين الفئة العمرية 15-34 بنسبة 40.2%. وكانت "الملاريا" أكثر الأمراض التي أصابت الفئة العمرية التي تتراوح أعمارهم ما بين 35 و54 بنسبة 25.3% من الحالات، وجاء المرض نفسه كأعلى معدّل إصابة بين الفئة العمرية 55-64 عاماً بنسبة 25.4%، في حين جاء "الالتهاب الكبدي الفيروسي ج" كأكثر الأمراض شيوعاً بين الفئة العمرية التي تبلغ أعمارها 65 عاماً فأكثر بنسبة بلغت 20.4%.

وعلى الرغم من أن "الجدري المائي" هو أكثر الأمراض المعدية إصابة لكل من المواطنين وغير المواطنين، فإن أنماط العدوى الأخرى مختلفة بين المواطنين وغير المواطنين باستثناء الفئة العمرية لمن هم 60 عاماً فأكثر،

حيث كان "التهاب الكبد الفيروسي ج" أكثر الأمراض المعدية انتشاراً بين المواطنين بنسبة 16.4%، وغير المواطنين 24.1%. وجاء "التهاب الكبد الفيروسي ج" كأكثر الأمراض المعدية شيوعاً بين المواطنين في الفئة العمرية 54-35 عاماً بنسبة 19.4%، بينما جاء "التهاب الكبد الفيروسي ب" كأكثر الأمراض المعدية إصابة للفئة العمرية 64-55 عاماً فأكثر بمعدّل بلغ 21.3%.

وتوضّح المقارنة أن "الملاريا" سجّلت أكبر نسبة إصابات للأمراض المعدية بين غير المواطنين في الفئة العمرية 54-35 عاماً بنسبة 27.3% والفئة العمرية 64-55 عاماً بنسبة 29.9%.

معدّل الإصابة بالأمراض المعدية (لكل 100,000 من السكان) حسب نوع المرض والجنسية والفئات العمرية، 2012

تشير مجموعة الجداول (17أ) و(17ب) و(17ج) إلى معدّل الإصابة لكل 100,000 من السكان بالأمراض المعدية حسب الفئات العمرية، بحيث يتناول الجدول الأول (17أ) بيانات المواطنين، والجدول الثاني (17ب) غير المواطنين، والجدول الثالث (17ج) كليهما. ويتوحيد أعداد الإصابة بالعدوى لكل 100,000 من السكان، تعكس معدّلات الإصابة الحجم النسبي لمدى الإصابة المنتشرة بين السكان.

تشير مجموعة الجداول (17) -بعد أن تمّ توحيد أعداد الإصابة بالعدوى حسب الحجم النسبي للسكان- إلى ارتفاع معدّل إصابة المواطنين بالجدري المائي مقارنة بغير المواطنين. وعلى الرغم من أنّ معدّل الإصابة بالملاريا بين غير المواطنين يأتي في المرتبة الثانية بمعدّل يبلغ 145.9 حالة لكل 100,000 من السكان، لا تكاد الملاريا توجد بين المواطنين (1.0 لكل 100,000 من السكان)، ويحتل "التسمّم الغذائي" المرتبة الثانية لهذه الفئة الفرعية من السكان بنسبة 96.5 حالة لكل 100,000 من السكان.

وقد بلغ المعدّل الإجمالي للإصابة بالأمراض المعدية خلال عام 2012 للمواطنين 1079.2 حالة لكل 100,000 من السكان. ونظراً إلى اختلاف معدّلات الإصابة حسب الفئات العمرية، فقد لوحظ أن أعلى نسبة إصابة بين المواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 0 و14 بلغت 2190.1 حالة لكل 100,000 من السكان، بينما كان أدنى مستوى بين المواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 35 و54 عاماً بمعدّل بلغ 303.7 حالة لكل 100,000 من السكان.

ويعدّ معدّل الإصابة بمرض "الجدري المائي" الأعلى بين المواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 0 و14 عاماً، حيث بلغ 1668.0 حالة لكل 100,000 من السكان، يلي ذلك في الترتيب "أنواع أخرى من التسمّم الغذائي" بمعدّل 196.9 حالة لكل 100,000 من السكان، ثم "الحمى القرمزية" بمعدّل 53.3 حالة لكل 100,000 من السكان، بعد ذلك جاءت "الإنفلونزا الموسمية" بمعدّل يبلغ 52.2 حالة لكل 100,000 من السكان.

ويعدّ معدّل الإصابة بمرض "الجدري المائي" الأعلى بين المواطنين في الفئة العمرية 15-34، حيث بلغ 132.9 حالة لكل 100,000 من السكان، متبوعاً "بالتهاب الكبد الوبائي ب" بمعدّل 53.6 حالة لكل 100,000 من السكان، تلا ذلك "أنواع أخرى من التسمّم الغذائي" بمعدّل 39.4 حالة لكل 100,000 من السكان.


ويعدّ معدّل الإصابة بمرض "التهاب الكبد الفيروسي ج" الأعلى بين المواطنين في الفئة العمرية 54-35 بمعدّل 58.9 حالة لكل 100,000 من السكان، ثم "التهاب الكبد الفيروسي ب" بمعدّل متساوي 52.4 حالة لكل 100,000 من السكان.

يعدّ معدّل الإصابة "بالتهاب الكبد الفيروسي ب" الأعلى بين المواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 55 و64 عاماً بمعدّل 82.6 حالة لكل 100,000 من السكان، يلي ذلك "التهاب الكبد الفيروسي ج" بمعدّل يبلغ 76.3 حالة لكل 100,000 من السكان، علماً بأن هناك إصابات بالأمراض المعدية لكنها بمعدّلات قليلة. ويعدّ معدّل الإصابة بمرض "التهاب الكبد الفيروسي ج" الأعلى بين المواطنين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر بمعدّل 87.3 حالة لكل 100,000 من السكان، يلي ذلك "التهاب الكبد الفيروسي ب" بمعدّل 77.6 حالة لكل 100,000 من السكان، ثم "السل الرئوي" بمعدّل 67.9 حالة لكل 100,000 من السكان، ثم "أنواع أخرى من التسمّم الغذائي" بمعدّل 58.2 حالة لكل 100,000 من السكان.

وعند تحليل معدّلات الإصابة عند غير المواطنين نجد أن أنماط الإصابة بالأمراض المعدية خلال عام 2012 قد اختلفت عن نظيراتها عند المواطنين حيث كان معدّل الإصابة بمرض "الجدري المائي" الأعلى بين الفئات العمرية 0-14 و15-34 بمعدّلات تبلغ 1434.9 و268.2 حالة لكل 100,000 من السكان على التوالي، وجاءت "الملايا" كأكثر الأمراض المعدية انتشاراً بين الفئات العمرية 35-55 عاماً و55-64 عاماً بمعدّلات بلغت 139.1 و175.1 حالة لكل 100,000 من السكان على التوالي. أما الفئة العمرية 65 عاماً فأكثر فعانت "التهاب الكبد الفيروسي ج" و"التهاب الكبد الفيروسي ب" كأكثر الأمراض شيوعاً بمعدّل 71.3 و124.8 حالة لكل 100,000 من السكان على التوالي.

وكانت "الأنواع الأخرى من التسمّم الغذائي" ثاني أعلى معدّل إصابة بين غير المواطنين في الفئة العمرية 0-14، والملايا للفئة العمرية 15-34، والجدري المائي للفئة العمرية 35-54، و"التهاب الكبد الفيروسي ج" للفئة العمرية 64-55 بالمعدّلات التالية بالترتيب 154.6 و173.5 و129.3 و109.9 حالة لكل 100,000 من السكان.

الشكل 10: معدّل الإصابة (لكل 100,000 من السكان) بالأمراض المعدية حسب نوع المرض والجنسية والفئات العمرية، 2012




المصدر: مركز الإحصاء- أبوظبي، هيئة الصحة - أبوظبي.

إخطارات الأمراض المعدية

يبين الجدول (18) إخطارات الأمراض المعدية، حيث يشير إلى وجود زيادة مطردة في معدلات إخطارات الأمراض المعدية، إذ بلغت الحالات 12,345 حالة خلال عام 2005، ارتفعت في العام 2011 لتصل إلى 20,295 حالة لكنها انخفضت قليلاً في عام 2012 وبلغت 19,268 حالة. ويبين الجدول (18) أن أكثر الإشعارات شيوعاً كانت لمرض "الجدري المائي" حيث يمثل على الدوام أكثر من 50% من العدد الإجمالي. وقد بلغت نسبة إخطارات المرض خلال عام 2010 ما يعادل 51.9%، إلا أن تلك النسبة قفزت إلى 57.9% في عام 2011، ومن ثم انخفضت قليلاً خلال عام 2012 لتصل إلى 51.2%. وحلت "الملاريا" في المرتبة الثانية خلال عامي 2011 و2012، حيث مثّلت 13.5% خلال عام 2011، و14.0% في عام 2012. وتلا ذلك مجموعة الأمراض ولكن بمعدلات صغيرة.

الشكل 11: الإخطارات من الأمراض المعدية، 2011-2012



المصدر: مركز الإحصاء- أبوظبي، هيئة الصحة - أبوظبي.


التبرّع بالدم

بيّن الجدول (19) أعداد المتبرّعين لبنك الدم والوحدات التي تمّ التبرّع بها حسب النوع خلال الفترة من 2008 إلى 2012. وقد ارتفع إجمالي عدد المتبرّعين بالدم في إمارة أبوظبي من 21,834 فرداً في عام 2008 إلى 26,819 في عام 2012، بزيادة بلغت 22.8% خلال الأعوام الخمسة. وخلال الفترة نفسها تظهر البيانات عند تصنيفها حسب الجنسية أن أعداد المتبرّعين المواطنين ارتفعت إلى 1,245 متبرّعاً بنسبة ارتفاع بلغت 32.5% خلال تلك الفترة، أما أعداد المتبرّعين غير المواطنين فقد ارتفعت إلى 3,740 متبرّعاً، لتسجّل ارتفاعاً بنسبة 20.7%.

ارتفع إجمالي عدد وحدات الدم المتبرّع بها في إمارة أبوظبي من 22,379 وحدة خلال عام 2008 إلى 26,819 وحدة في عام 2012، بزيادة مقدارها 19.8% خلال الأعوام الخمسة. وتشير البيانات إلى أن أعداد الوحدات المتبرّع بها خلال عام 2008 فاق عدد المتبرّعين، ما يعني أن بعض المتبرّعين قام بالتبرّع أكثر من مرة خلال العام نفسه.

وفيما يتعلّق بنوع وحدات الدم المتبرّع بها خلال الأعوام 2008 و2009 و2010 و2011 و2012، اتّضح أن أكثر من ثلث الوحدات من نوع "O+" إذ بلغت 37.15% و36.2% و36.5% و37.4% و38.3% على التوالي. في حين جاءت وحدات الدم المتبرّع بها من نوع "A+" في المرتبة الثانية خلال أعوام 2008 و2010 و2012 بنسب بلغت 26.1% و25.6% و25.0% على التوالي، وحلّت وحدات الدم المتبرّع بها من نوع "B+" في المرتبة الثانية خلال عام 2009 بنسبة بلغت 25.9%.

الشكل 12: المتبرعون بالدم حسب الجنسية، 2011-2012



المصدر: مركز الإحصاء- أبوظبي، هيئة الصحة - أبوظبي.

الجدول الإحصائية

- 19..... جدول 2: عدد المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات حسب المنطقة، 2008-2012
- 19..... جدول 3: المستشفيات حسب المنطقة والقطاع، 2008-2012
- 20..... جدول 4: عدد المنشآت الصحية الحكومية والأسرة، 1973-2012
- 21..... جدول 5: الأسرة والمرضى النزل في المستشفيات الحكومية حسب المنطقة، 2010-2012
- 21..... جدول 6: الكوادر الطبية لكل 1,000 من السكان حسب المنطقة 2008-2012
- 22..... جدول 7: الكوادر الطبية، 1974-2012
- 23..... جدول 8: المرضى النزل والخارجيون، 2012
- 23..... جدول 9: معدّل الوفيات (لكل 100,000 من السكان) حسب سبب الوفاة، 2012
- 24..... جدول 10: التوزيع النسبي للوفيات حسب سبب الوفاة، 2005، 2009-2012
- 25..... جدول 11أ: نسبة الوفيات حسب سبب الوفاة والجنسية والنوع، 2012
- 26..... جدول 11ب: نسبة الوفيات حسب سبب الوفاة والجنسية والنوع، 2012 (يتبع)
- 27..... جدول 11ج: نسبة الوفيات حسب سبب الوفاة والجنسية والنوع، 2012 (يتبع)
- 28..... جدول 12أ: نسبة الوفيات حسب سبب الوفاة والجنسية والفئات العمرية، 2012
- 29..... جدول 12ب: نسبة الوفيات حسب سبب الوفاة والجنسية والفئات العمرية، 2012 (يتبع)
- 30..... جدول 12ج: نسبة الوفيات حسب سبب الوفاة والجنسية والفئات العمرية، 2012 (يتبع)
- 32..... جدول 13ب: معدّل الوفاة (لكل 100,000 من السكان) حسب سبب الوفاة والجنسية والنوع، 2012 (يتبع)
- 33..... جدول 13ج: معدّل الوفاة (لكل 100,000 من السكان) حسب سبب الوفاة والجنسية والنوع، 2012 (يتبع)
- 34..... جدول 14أ: معدّل الوفاة (لكل 100,000 من السكان) حسب سبب الوفاة والجنسية والفئات العمرية، 2012
- 35..... جدول 14ب: معدّل الوفاة (لكل 100,000 من السكان) حسب سبب الوفاة والجنسية والفئات العمرية، 2012 (يتبع)
- 36..... جدول 14ج: معدّل الوفاة (لكل 100,000 من السكان) حسب سبب الوفاة والجنسية والفئات العمرية، 2012 (يتبع)
- 37..... جدول 15: معدّل وفيات السرطان (لكل 100,000 من السكان) حسب النوع والجنسية، 2009-2012
- 38..... جدول 16أ: نسبة الإصابة بالأمراض المعدية حسب نوع المرض والجنسية والفئات العمرية، 2012
- 39..... جدول 16ب: نسبة الإصابة بالأمراض المعدية حسب نوع المرض والجنسية والفئات العمرية، 2012 (يتبع)
- 40..... جدول 16ج: نسبة الإصابة بالأمراض المعدية حسب نوع المرض والجنسية والفئات العمرية، 2012 (يتبع)
- 40..... جدول 17أ: معدّل الإصابة (لكل 100,000 من السكان) بالأمراض المعدية حسب نوع المرض والجنسية والفئات العمرية، 2012
- 41..... جدول 17ب: معدّل الإصابة (لكل 100,000 من السكان) بالأمراض المعدية حسب نوع المرض والجنسية والفئات العمرية، 2012 (يتبع)
- 42..... جدول 17ج: معدّل الإصابة (لكل 100,000 من السكان) بالأمراض المعدية حسب نوع المرض والجنسية والفئات العمرية، 2012 (يتبع)
- 43..... جدول 18: إخطارات الأمراض المعدية، 2005، 2009-2012
- 45..... جدول 19: المتبرعون بالدم والوحدات المتبرّع بها حسب الفصيلة، 2008-2012

الجدول الإحصائية

جدول 2: عدد المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات حسب المنطقة، 2012-2008

2012	2011	2010	2009	2008	المنطقة والقطاع الإجمالي
39	35	33	39	39	المستشفيات
540	494	435	360	386	المراكز الصحيّة
316	265	239	207	196	العيادات
					أبوظبي
22	19	18	23	24	المستشفيات
385	348	310	260	286	المراكز الصحيّة
201	180	168	134	125	العيادات
					العين
11	10	9	10	9	المستشفيات
129	124	110	95	95	المراكز الصحيّة
100	81	68	68	66	العيادات
					المنطقة الغربية
6	6	6	6	6	المستشفيات
26	22	15	5	5	المراكز الصحيّة
15	4	3	5	5	العيادات

المصدر: هيئة الصحة - أبوظبي.

جدول 3: المستشفيات حسب المنطقة والقطاع، 2012-2008

2012	2011	2010	2009	2008	المنطقة والقطاع الإجمالي
39	35	33	39	39	الإجمالي
12	12	12	12	12	حكومي
25	21	19	25	25	خاص
2	2	2	2	2	عسكري
22	19	18	23	24	أبوظبي
4	4	4	4	4	حكومي
17	14	13	18	19	خاص
1	1	1	1	1	عسكري
11	10	9	10	9	العين
3	3	3	3	3	حكومي
7	6	5	6	5	خاص
1	1	1	1	1	عسكري
6	6	6	6	6	الغربية
5	5	5	5	5	حكومي
1	1	1	1	1	خاص
0	0	0	0	0	عسكري

المصدر: هيئة الصحة - أبوظبي.

جدول 4: عدد المنشآت الصحيّة الحكومية والأسرّة، 1973-2012

العام	المستشفيات	الأسرّة	الأسرّة لكل 1000 من السكان
1973	2	472	3.4
1974	2	472	3.0
1975	2	517	2.6
1976	2	616	2.7
1977	2	859	3.2
1978	4	1,046	3.4
1979	5	1,656	4.6
1980	5	1,605	3.8
1981	6	2,149	4.8
1982	7	1,897	4.1
1983	7	2,014	4.1
1984	9	2,383	4.6
1985	10	2,267	4.1
1986	10	2,287	3.9
1987	13	2,609	4.3
1988	13	2,441	3.8
1989	13	2,451	3.6
1990	13	2,551	3.6
1991	13	2,466	3.3
1992	13	2,425	3.1
1993	13	2,419	2.9
1994	13	2,443	2.8
1995	13	2,541	2.8
1996	13	2,623	2.7
1997	13	2,504	2.5
1998	13	2,469	2.4
1999	13	2,529	2.4
2000	13	2,491	2.2
2001	13	2,022	1.7
2002	15	1,992	1.7
2003	16	2,003	1.6
2004	14	1,980	1.5
2005	12	2,343	1.7
2006	12	2,367	1.6
2007	12	2,439	1.5
2008	12	2,596	1.5
2009	12	2,652	1.5
2010	12	2,582	1.3
2011	12	2,610	1.2
2012	12	2,670	1.1

المصدر: وزارة الصحة (1973-2005)، وهيئة الصحة - أبوظبي (2006-2012).

جدول 5: الأسرة والمرضى النزلاء في المستشفيات الحكومية حسب المنطقة، 2010-2012

المنطقة الإجمالي	2012	2011	2010
أعداد الأسرة	2,670	2610	2,582
المرضى النزلاء	96,700	83,978	86,136
المرضى النزلاء لكل سرير	36	32	33
أبوظبي			
أعداد الأسرة	1,617	1511	1,504
المرضى النزلاء	54,000	45,896	48,409
المرضى النزلاء لكل سرير	33	30	32
العين			
أعداد الأسرة	789	837	824
المرضى النزلاء	36,400	31,961	31,870
المرضى النزلاء لكل سرير	46	38	39
الغربية			
أعداد الأسرة	264	262	254
المرضى النزلاء	6,300	6,121	5,857
المرضى النزلاء لكل سرير	24	23	23

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي، وهيئة الصحة - أبوظبي.

جدول 6: الكوادر الطبية لكل 1,000 من السكان حسب المنطقة 2008-2012

المنطقة الإجمالي	2012	2011	2010	2009	2008
الأطباء	237	231	242	237	312
هيئة التمريض	530	495	418	446	406
أطباء الأسنان	42	41	45	45	49
أبوظبي					
الأطباء	264	242	258	271	غير متوفر
هيئة التمريض	592	532	433	458	غير متوفر
أطباء الأسنان	48	45	50	52	غير متوفر
العين					
الأطباء	241	249	243	211	غير متوفر
هيئة التمريض	545	518	449	491	غير متوفر
أطباء الأسنان	41	42	45	39	غير متوفر
الغربية					
الأطباء	94	118	118	104	غير متوفر
هيئة التمريض	190	222	244	233	غير متوفر
أطباء الأسنان	11	14	13	14	غير متوفر

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي، وهيئة الصحة - أبوظبي.

جدول 7: الكوادر الطبية، 1974-2012

العام	الأطباء	أطباء الأسنان	هيئة التمريض والمساعدون
1974	131	9	غير متوفر
1975	288	34	غير متوفر
1976	379	34	غير متوفر
1977	398	30	غير متوفر
1978	462	31	غير متوفر
1979	608	37	غير متوفر
1980	586	46	غير متوفر
1981	702	49	1,804
1982	661	43	1,716
1983	667	43	1,867
1984	690	43	2,255
1985	625	48	2,027
1986	642	46	2,043
1987	756	51	2,235
1988	837	58	2,404
1989	805	58	2,390
1990	808	58	2,421
1991	849	57	2,527
1992	896	68	2,752
1993	968	102	2,765
1994	1,035	105	2,891
1995	1,103	113	3,088
1996	1,161	131	3,264
1997	1,241	127	3,385
1998	1,308	139	3,615
1999	1,381	142	3,747
2000	1,306	137	3,769
2001	1,180	127	2,897
2002	1,177	124	2,878
2003	1,196	144	2,944
2004	1,185	141	2,923
2005	1,246	143	2,945
2006	1,784	غير متوفر	4,800
2007	1,662	غير متوفر	4,976
2008	2,786	غير متوفر	4,976
2009	1,822	غير متوفر	5,846
2010	2,026	غير متوفر	5,222
2011	1,966	54	5,328
2012	2,064	56	5,543

المصدر: وزارة الصحة (1974-2005)، وهيئة الصحة - أبوظبي (2006-2012).

جدول 8: المرضى النزلاء والخارجيون، 2012

المرضى الخارجيون		المرضى النزلاء		المنطقة
النسبة المئوية	العدد	النسبة المئوية	العدد	
	2,233,418		163,900	إجمالي المرضى
100.00%	2,376,100	100.00%	96,700	حكومي
49.18%	1,168,600	55.84%	54,000	منطقة أبوظبي
38.21%	907,800	37.64%	36,400	منطقة العين
12.61%	299,700	6.52%	6,300	الغربية
100.00%	3,740,600	100.00%	67,200	خاص
76.70%	2,868,100	73.10%	49,100	منطقة أبوظبي
22.50%	842,600	26.30%	17,700	منطقة العين
0.80%	29,900	0.60%	400	الغربية

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي، وهيئة الصحة - أبوظبي.

جدول 9: معدّل الوفيات (لكل 100,000 من السكان) حسب سبب الوفاة، 2012

المعدّل	أسباب الوفاة
48.6	أمراض القلب والأوعية الدموية
20.3	الأسباب الخارجية للاعتلال والوفاة
19.3	الأورام السرطانية
5.7	أمراض الجهاز التنفسي
5.5	أعراض وعلامات سريرية غير طبيعية غير مصنفة في مكان آخر
3.5	الإصابة والتسمم وغيرها من الأسباب الخارجية
2.7	الغدد الصماء وأمراض التغذية والأبيض
3.0	بعض الظروف الناشئة في فترة ما حول الولادة
3.6	بعض الأمراض المعدية والطفيلية
3.6	التشوهات الخلقية والتشوهات الصغية
2.6	أمراض الجهاز الهضمي
2.2	أمراض الجهاز التناسلي
1.6	أمراض الجهاز العصبي
0.4	أمراض الدم والأعضاء التي تكوّن الدم واضطرابات المناعة
0.5	أمراض الجهاز العضلي والأنسجة الضامة
0.0	أمراض الجلد والأنسجة تحت الجلد
0.1	أمراض الحمل والولادة
0.1	أمراض الأذن وعملية الخشاء
0.0	أمراض العين وملحقاتها
0.1	الاضطرابات النفسية والسلوكية
0.5	غير مبيّن

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي، وهيئة الصحة - أبوظبي.

جدول 10: التوزيع النسبي للوفيات حسب سبب الوفاة، 2005، 2009-2012

2012	2011	2010	2009	2005	
2,923	2,902	2,879	2,988	2,446	العدد الإجمالي لحالات الوفاة
النسبة المئوية					سبب الوفاة
100	100	100	100	100	الإجمالي
38.8	37.5	26.5	24.3	17.3	أمراض القلب والأوعية الدموية
16.2	16.6	19	21.6	23.1	الأسباب الخارجية للاعتلال والوفاة
15.4	3.4	1.5	2.0		الإصابات والتسمم وعواقب أخرى غير معيّنة لأسباب خارجية
2.8	15.9	16.2	13.4	12.0	الأورام السرطانية
2.2	3.4	6.7	7.1	5.4	أمراض الغدد الصماء والتغذية والأمراض الأيضية
2.9	2.5	4.9	7.0	6.4	التشوهات والعاهات والشذوذ الكروموسومي
21.7	20.7	25.3	24.7	35.7	أسباب أخرى

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي، هيئة الصحة - أبوظبي.

جدول 11أ: نسبة الوفيات حسب سبب الوفاة والجنسية والنوع، 2012

المواطنون			سبب الوفاة
الإناث	الذكور	العدد الإجمالي	
352	618	976	العدد الإجمالي لحالات الوفاة *
النسبة المئوية			الإجمالي (%)
100	100	100	
32.4	36.2	34.6	أمراض القلب والأوعية الدموية
5.4	15.4	11.9	الأسباب الخارجية للاعتلال والوفاة
20.7	13.4	16.0	الأورام السرطانية
7.8	8.4	8.2	أمراض الجهاز التنفسي
5.4	4.0	4.6	أعراض وعلامات سريرية غير مصنفة في مكان آخر
1.7	2.3	2.2	الإصابة والتسمم وغيرها من الأسباب الخارجية
4.0	2.1	2.8	الغدغ الصماء وأمراض التغذية والأبيض
4.3	2.9	3.4	بعض الظروف الناشئة في فترة ما حول الولادة
4.3	2.9	3.4	بعض الأمراض المعدية والطفيلية
5.1	4.0	4.6	التشوهات الخلقية والتشوهات الصبغية
1.1	2.9	2.3	أمراض الجهاز الهضمي
3.7	2.8	3.1	أمراض الجهاز التناسلي
2.8	1.6	2.0	أمراض الجهاز العصبي
0.0	0.0	0.0	أمراض الدم والأعضاء التي تكوّن الدم واضطرابات المناعة
0.9	0.0	0.3	أمراض الجهاز العضلي والأنسجة الضامة
0.0	0.0	0.0	أمراض الجلد والأنسجة تحت الجلد
0.0	0.0	0.0	أمراض الحمل والولادة
0.0	0.0	0.0	أمراض الأذن وعملية الخشاء
0.0	0.0	0.0	أمراض العين وملحقاتها
0.0	0.2	0.1	الاضطرابات النفسية والسلوكية
0.3	0.8	0.6	غير مبيّن

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي، وهيئة الصحة - أبوظبي.
*تم استبعاد الحالات غير مبينة الجنسية ويبلغ عددها 6 حالات

جدول 11ب: نسبة الوفيات حسب سبب الوفاة والجنسية والنوع، 2012 (يتبع)

غير المواطنين			سبب الوفاة
الإناث	الذكور	العدد الإجمالي	
508	1,434	1,945	العدد الإجمالي لحالات الوفاة *
النسبة المئوية			الإجمالي (%)
100	100	100	
28.1	45.5	40.9	أمراض القلب والأوعية الدموية
5.9	21.3	17.2	الأسباب الخارجية للاعتلال والوفاة
30.5	11.3	16.3	الأورام السرطانية
5.3	1.8	2.8	أمراض الجهاز التنفسي
7.7	5.2	5.7	أعراض وعلامات سريرية غير مصنفة في مكان آخر
2.0	3.4	3.0	الإصابة والتسمم وغيرها من الأسباب الخارجية
2.0	1.8	1.9	الغدغ الصماء، وأمراض التغذية والأبيض
2.8	1.6	1.9	بعض الظروف الناشئة في فترة ما حول الولادة
4.3	1.9	2.6	بعض الأمراض المعدية والطفيلية
3.1	1.7	2.1	التشوهات الخلقية والتشوهات الصغية
2.2	2.0	2.0	أمراض الجهاز الهضمي
1.8	0.9	1.1	أمراض الجهاز التناسلي
0.8	0.9	0.9	أمراض الجهاز العصبي
1.0	0.3	0.5	أمراض الدم والأعضاء التي تكوّن الدم واضطرابات المناعة
1.0	0.3	0.5	أمراض الجهاز العضلي والأنسجة الضامة
0.0	0.0	0.0	أمراض الجلد والأنسجة تحت الجلد
0.4	0.0	0.1	أمراض الحمل والولادة
0.2	0.1	0.1	أمراض الأذن وعملية الخشاء
0.0	0.0	0.1	أمراض العين وملحقاتها
0.2	0.1	0.1	الاضطرابات النفسية والسلوكية
0.8	0.1	0.3	غير مبيّن

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي، وهيئة الصحة - أبوظبي.
*تم استبعاد الحالات غير مبيّنة الجنسية وبلغ عددها 3 حالات

جدول 11ج: نسبة الوفيات حسب سبب الوفاة والجنسية والنوع، 2012 (يتبع)

المواطنون وغير المواطنين			سبب الوفاة
الإناث	الذكور	العدد الإجمالي	
860	2,052	2,912	العدد الإجمالي لحالات الوفاة *
النسبة المئوية			الإجمالي (%)
100	100	100	
29.9	42.7	38.9	أمراض القلب والأوعية الدموية
5.7	19.5	15.4	الأسباب الخارجية للاعتلال والوفاة
26.5	11.9	16.2	الأورام السرطانية
6.4	3.8	4.6	أمراض الجهاز التنفسي
6.7	4.8	5.4	أعراض وعلامات سريرية غير مصنفة في مكان آخر
1.9	3.1	2.7	الإصابة والتسمم وغيرها من الأسباب الخارجية
2.8	1.9	2.2	الغدغ الصماء وأمراض التغذية والأبيض
3.4	2.0	2.4	بعض الظروف الناشئة في فترة ما حول الولادة
4.3	2.2	2.8	بعض الأمراض المعدية والطفيلية
4.0	2.4	2.9	التشوهات الخلقية والتشوهات الصغية
1.7	2.2	2.1	أمراض الجهاز الهضمي
2.6	1.5	1.8	أمراض الجهاز التناسلي
1.6	1.1	1.3	أمراض الجهاز العصبي
0.6	0.2	0.3	أمراض الدم والأعضاء التي تكوّن الدم واضطرابات المناعة
0.9	0.2	0.4	أمراض الجهاز العضلي والأنسجة الضامة
0.0	0.0	0.0	أمراض الجلد والأنسجة تحت الجلد
0.2	0.0	0.1	أمراض الحمل والولادة
0.1	0.0	0.1	أمراض الأذن وعملية الخشاء
0.0	0.0	0.0	أمراض العين وملحقاتها
0.1	0.1	0.1	الاضطرابات النفسية والسلوكية
0.6	0.3	0.4	غير مبيّن

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي، وهيئة الصحة - أبوظبي.

*تمّ استبعاد الحالات غير مبيّنة الجنسية أو الجنس ويبلغ عددها 11 حالات.

جدول 12أ: نسبة الوفيات حسب سبب الوفاة والجنسية والفئات العمرية، 2012

المواطنون						سبب الوفاة
60+	59-45	44-30	29-15	14-0	الإجمالي	
488	141	70	108	169	976	العدد الإجمالي لحالات الوفاة*
النسبة المئوية						
100	100	100	100	100	100	الإجمالي (%)
41.8	41.8	40.0	20.4	14.8	34.6	أمراض القلب والأوعية الدموية
2.0	11.3	18.6	51.9	12.4	11.9	الأسباب الخارجية للاعتلال والوفاة
20.5	25.5	10.0	6.5	3.6	16.0	الأورام السرطانية
13.3	2.1	8.6	2.8	1.8	8.2	أمراض الجهاز التنفسي
7.4	0.7	1.4	0.9	3.6	4.6	أعراض وعلامات سريرية غير مصنّفة في مكان آخر
0.2	1.4	7.1	7.4	3.0	2.2	الإصابة والتسمّم وغيرها من الأسباب الخارجية
3.3	2.1	1.4	1.9	3.0	2.8	الغدد الصماء وأمراض التغذية والأبيض
0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	3.4	بعض الظروف الناشئة في فترة ما حول الولادة
3.5	4.3	1.4	1.9	4.1	3.4	بعض الأمراض المعدية والطفيلية
0.0	0.0	0.0	1.9	25.4	4.6	التشوّهات الخلقية والتشوهات الصبغية
1.4	7.1	4.3	0.0	1.2	2.3	أمراض الجهاز الهضمي
4.5	2.8	1.4	0.9	1.2	3.1	أمراض الجهاز التناسلي
1.8	0.0	4.3	3.7	2.4	2.0	أمراض الجهاز العصبي
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	أمراض الدم والأعضاء التي تكوّن الدم واضطرابات المناعة
0.2	0.7	0.0	0.0	0.6	0.3	أمراض الجهاز العضلي والأنسجة الضامة
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	أمراض الجلد والأنسجة تحت الجلد
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	أمراض الحمل والولادة
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	أمراض الأذن وعملية الخشاء
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	أمراض العين وملحقاتها
0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.1	الاضطرابات النفسية والسلوكية
0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.6	غير مبيّن

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي، وهيئة الصحة - أبوظبي.
*تم استبعاد الحالات غير مبيّنة الجنسية وبلغ عددها 6 حالات

جدول 12ب: نسبة الوفيات حسب سبب الوفاة والجنسية والفئات العمرية، 2012 (بتبع)

غير المواطنين						سبب الوفاة
60+	59-45	44-30	29-15	14-0	الإجمالي	
508	551	453	263	170	1,945	العدد الإجمالي لحالات الوفاة*
النسبة المئوية						الإجمالي (%)
100	100	100	100	100	100	
41.3	50.1	47.7	29.7	9.4	40.9	أمراض القلب والأوعية الدموية
2.4	11.4	25.4	45.2	15.3	17.2	الأسباب الخارجية للاعتلال والوفاة
27.4	20.3	9.1	5.3	7.1	16.3	الأورام السرطانية
6.1	1.5	1.3	0.8	4.1	2.8	أمراض الجهاز التنفسي
8.7	3.6	5.7	6.1	4.1	5.8	أعراض وعلامات سريرية غير مصنفة في مكان آخر
0.0	3.3	5.1	6.1	1.2	3.0	الإصابة والتسمم وغيرها من الأسباب الخارجية
2.6	2.0	0.9	0.8	3.5	1.9	الغدد الصماء وأمراض التغذية والأبيض
0.0	0.0	0.0	0.0	21.8	1.9	بعض الظروف الناشئة في فترة ما حول الولادة
4.1	2.9	0.9	1.5	2.9	2.6	بعض الأمراض المعدية والطفيلية
0.0	0.0	0.2	0.4	22.4	2.1	التشوهات الخلقية والتشوهات الصبغية
2.6	2.7	1.5	0.8	1.2	2.0	أمراض الجهاز الهضمي
2.8	0.7	0.9	0.0	0.0	1.1	أمراض الجهاز التناسلي
0.6	0.5	0.4	2.7	1.2	0.9	أمراض الجهاز العصبي
0.4	0.2	0.0	0.0	3.5	0.5	أمراض الدم والأعضاء التي تكوّن الدم واضطرابات المناعة
0.6	0.5	0.2	0.8	0.0	0.5	أمراض الجهاز العضلي والأنسجة الضامة
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	أمراض الجلد والأنسجة تحت الجلد
0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.1	أمراض الحمل والولادة
0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	أمراض الأذن وعملية الخشاء
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	أمراض العين وملحقاتها
0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	الاضطرابات النفسية والسلوكية
0.0	0.0	0.2	0.0	2.4	0.3	غير مبيّن

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي، وهيئة الصحة - أبوظبي.
* تم استبعاد الحالات غير مبيّنة الجنسية ويبلغ عددها 3 حالات

جدول 12ج: نسبة الوفيات حسب سبب الوفاة والجنسية والفئات العمرية، 2012 (يتبع)

المواطنون وغير المواطنين						سبب الوفاة
60+	59-45	44-30	29-15	14-0	الإجمالي	
996	692	523	371	339	2,921	العدد الإجمالي لحالات الوفاة *
النسبة المئوية						الإجمالي (%)
100	100	100	100	100	100	
41.6	48.4	46.7	27.0	12.1	38.8	أمراض القلب والأوعية الدموية
2.2	11.4	24.5	47.2	13.9	15.4	الأسباب الخارجية للاعتلال والوفاة
24.0	21.4	9.2	5.7	5.3	16.2	الأورام السرطانية
9.6	1.6	2.3	1.3	2.9	4.6	أمراض الجهاز التنفسي
8.0	3.0	5.2	4.6	3.8	5.4	أعراض وعلامات سريرية غير مصنفة في مكان آخر
0.1	2.9	5.4	6.5	2.1	2.7	الإصابة والتسمم وغيرها من الأسباب الخارجية
2.9	2.0	1.0	1.1	3.2	2.2	الغدد الصماء وأمراض التغذية والأبيض
0.0	0.0	0.0	0.0	20.6	2.4	بعض الظروف الناشئة في فترة ما حول الولادة
3.8	3.2	1.0	1.6	3.5	2.8	بعض الأمراض المعدية والطفيلية
0.0	0.0	0.2	0.8	23.9	2.9	التشوهات الخلقية والتشوهات الصبغية
2.0	3.6	1.9	0.5	1.2	2.1	أمراض الجهاز الهضمي
3.6	1.2	1.0	0.3	0.6	1.8	أمراض الجهاز التناسلي
1.2	0.4	1.0	3.0	1.8	1.3	أمراض الجهاز العصبي
0.2	0.1	0.0	0.0	1.8	0.3	أمراض الدم والأعضاء التي تكوّن الدم واضطرابات المناعة
0.4	0.6	0.2	0.5	0.3	0.4	أمراض الجهاز العضلي والأنسجة الضامة
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	أمراض الجلد والأنسجة تحت الجلد
0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.1	أمراض الحمل والولادة
0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	أمراض الأذن وعملية الخشاء
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	أمراض العين وملحقاتها
0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	الاضطرابات النفسية والسلوكية
0.0	0.0	0.2	0.0	2.9	0.4	غير مبيّن

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي، وهيئة الصحة - أبوظبي.

*تمّ استبعاد الحالات غير مبيّنة الجنسية أو الجنس ويبلغ عددها 11 حالات.

جدول 13أ: معدّل الوفاة (لكل 100,000 من السكان) حسب سبب الوفاة والجنسية والنوع، 2012

سبب الوفاة	المواطنون		
	الإناث	الذكور	الإجمالي
العدد الإجمالي لحالات الوفاة*	352	618	976
معدّل الوفيات لكل 100,000 من السكان			
الإجمالي	152.8	250.8	204.7
أمراض القلب والأوعية الدموية	49.5	90.9	70.9
الأسباب الخارجية للاعتلال والوفاة	8.2	38.6	23.9
الأورام السرطانية	31.7	33.7	32.7
أمراض الجهاز التنفسي	12.2	21.1	16.8
أعراض وعلامات سريرية غير مصنّفة في مكان آخر	8.2	10.1	9.2
الإصابة والتسمّم وغيرها من الأسباب الخارجية	2.6	5.7	4.2
الغدد الصماء وأمراض التغذية والأبيض	6.1	5.3	5.7
بعض الظروف الناشئة في فترة ما حول الولادة	6.5	7.3	6.9
بعض الأمراض المعدية والطفيلية	6.5	7.3	6.9
التشوهات الخلقية والتشوهات الصغرية	7.8	10.1	9.0
أمراض الجهاز الهضمي	1.7	7.3	4.6
أمراض الجهاز التناسلي	5.6	6.9	6.3
أمراض الجهاز العصبي	4.3	4.1	4.2
أمراض الدم والأعضاء التي تكوّن الدم واضطرابات المناعة	0.0	0.0	0.0
أمراض الجهاز العضلي والأنسجة الضامة	1.3	0.0	0.6
أمراض الجلد والأنسجة تحت الجلد	0.0	0.0	0.0
أمراض الحمل والولادة	0.0	0.0	0.0
أمراض الأذن وعملية الخشاء	0.0	0.0	0.0
أمراض العين وملحقاتها	0.0	0.0	0.0
الاضطرابات النفسية والسلوكية	0.0	0.4	0.0
غير مبيّن	0.4	2.0	1.3

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي، وهيئة الصحة - أبوظبي.
* تم استبعاد الحالات غير مبينة الجنسية وبلغ عددها 6 حالات

جدول 13ب: معدّل الوفاة (لكل 100,000 من السكان) حسب سبب الوفاة والجنسية والنوع، 2012 (بتبع)

سبب الوفاة	غير المواطنين		
	الإجمالي	الذكور	الإناث
العدد الإجمالي لحالات الوفاة*	1,945	1,434	508
معدّل الوفيات لكل 100,000 من السكان			
الإجمالي	104.7	101.3	114.9
أمراض القلب والأوعية الدموية	42.8	46.1	32.3
الأسباب الخارجية للاعتلال والوفاة	18.0	21.5	6.8
الأورام السرطانية	17.1	11.4	35.1
أمراض الجهاز التنفسي	2.9	1.8	6.1
أعراض وعلامات سريرية غير مصنّفة في مكان آخر	6.1	5.2	8.8
الإصابة والتسمّم وغيرها من الأسباب الخارجية	3.2	3.5	2.3
الغدد الصماء وأمراض التغذية والأبيض	1.9	1.8	2.3
بعض الظروف الناشئة في فترة ما حول الولادة	2.0	1.6	3.2
بعض الأمراض المعدية والطفيلية	2.6	1.9	5.0
التشوّهات الخَلقيّة والتشويّهات الصبغية	2.2	1.7	3.6
أمراض الجهاز الهضمي	2.1	2.0	2.5
أمراض الجهاز التناسلي	1.2	0.9	2.0
أمراض الجهاز العصبي	0.9	0.9	0.9
أمراض الدم والأعضاء التي تكوّن الدم واضطرابات المناعة	0.5	0.3	1.1
أمراض الجهاز العضلي والأنسجة الضامة	0.5	0.3	1.1
أمراض الجلد والأنسجة تحت الجلد	0.0	0.0	0.0
أمراض الحمل والولادة	0.1	0.0	0.5
أمراض الأذن وعملية الخشاء	0.1	0.1	0.2
أمراض العين وملحقاتها	0.0	0.0	0.0
الاضطرابات النفسية والسلوكية	0.1	0.1	0.2
غير مبيّن	0.3	0.1	0.9

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي، وهيئة الصحة - أبوظبي.
*تم استبعاد الحالات غير مبيّنة الجنسية ويبلغ عددها 3 حالات

جدول 13ج: معدّل الوفاة (لكل 100,000 من السكان) حسب سبب الوفاة والجنسية والنوع، 2012 (يتبع)

المواطنون وغير المواطنين			سبب الوفاة
الإناث	الذكور	الإجمالي	
860	2,052	2,912	العدد الإجمالي لحالات الوفاة *
معدّل الوفيات لكل 100,000 من السكان			
127.9	123.5	124.7	الإجمالي
38.2	52.8	48.6	أمراض القلب والأوعية الدموية
7.3	24.1	19.2	الأسباب الخارجية للاعتلال والوفاة
33.9	14.7	20.3	الأورام السرطانية
8.2	4.7	5.7	أمراض الجهاز التنفسي
8.6	6.0	6.7	أعراض وعلامات سريرية غير مصنّفة في مكان آخر
2.4	3.8	3.4	الإصابة والتسمّم وغيرها من الأسباب الخارجية
3.6	2.3	2.7	الغدد الصماء وأمراض التغذية والأبيض
4.3	2.5	3.0	بعض الظروف الناشئة في فترة ما حول الولادة
5.5	2.7	3.5	بعض الأمراض المعدية والطفيلية
5.1	2.9	3.6	التشوّهات الخَلقيّة والتشويّهات الصبغية
2.2	2.8	2.6	أمراض الجهاز الهضمي
3.3	1.8	2.2	أمراض الجهاز التناسلي
2.1	1.4	1.6	أمراض الجهاز العصبي
0.7	0.2	0.4	أمراض الدم والأعضاء التي تكوّن الدم واضطرابات المناعة
1.2	0.2	0.5	أمراض الجهاز العضلي والأنسجة الضامة
0.0	0.0	0.0	أمراض الجلد والأنسجة تحت الجلد
0.3	0.0	0.1	أمراض الحمل والولادة
0.1	0.1	0.1	أمراض الأذن وعملية الخشاء
0.0	0.0	0.0	أمراض العين وملحقاتها
0.1	0.1	0.1	الاضطرابات النفسية والسلوكية
0.7	0.4	0.5	غير مبيّن

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي، وهيئة الصحة - أبوظبي.
*تمّ استبعاد الحالات غير مبيّنة الجنسية أو الجنس ويبلغ عددها 11 حالات.

جدول 14أ: معدّل الوفاة (لكل 100,000 من السكان) حسب سبب الوفاة والجنسية والفئات العمرية، 2012

المواطنون						سبب الوفاة
60+	59-45	44-30	29-15	14-0	الإجمالي	
488	141	70	108	169	976	العدد الإجمالي لحالات الوفاة*
معدّل الوفيات لكل 100,000 من السكان						
2885.7	390.3	75.7	73.3	91.9	204.7	العدد الإجمالي للحالات
1206.3	163.3	30.3	30.7	13.6	70.9	أمراض القلب والأوعية الدموية
59.1	44.3	14.1	78.3	11.4	24.3	الأسباب الخارجية للاعتلال والوفاة
591.3	99.6	7.6	9.8	3.3	32.7	الأورام السرطانية
384.4	8.3	6.5	4.2	1.6	16.8	أمراض الجهاز التنفسي
212.9	2.8	1.1	1.4	3.3	9.4	أعراض وعلامات سريرية غير مصنّفة في مكان آخر
5.9	5.5	5.4	11.2	2.7	4.4	الإصابة والتسمّم وغيرها من الأسباب الخارجية
94.6	8.3	1.1	2.8	2.7	5.7	الغدد الصماء وأمراض التغذية والأبيض
0.0	0.0	0.0	0.0	17.9	6.9	بعض الظروف الناشئة في فترة ما حول الولادة
100.5	16.6	1.1	2.8	3.8	6.9	بعض الأمراض المعدية والطفيلية
0.0	0.0	0.0	2.8	23.4	9.4	التشوّهات الخلقية والتشويبهات الصبغية
41.4	27.7	3.2	0.0	1.1	4.6	أمراض الجهاز الهضمي
130.1	11.1	1.1	1.4	1.1	6.3	أمراض الجهاز التناسلي
53.2	0.0	3.2	5.6	2.2	4.2	أمراض الجهاز العصبي
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	أمراض الدم والأعضاء التي تكوّن الدم واضطرابات المناعة
5.9	2.8	0.0	0.0	0.5	0.6	أمراض الجهاز العضلي والأنسجة الضامة
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	أمراض الجلد والأنسجة تحت الجلد
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	أمراض الحمل والولادة
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	أمراض الأذن وعملية الخشاء
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	أمراض العين وملحقاتها
0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.2	الاضطرابات النفسية والسلوكية
0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	1.3	غير مبيّن

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي، وهيئة الصحة - أبوظبي.

* تم استبعاد الحالات غير مبيّنة الجنسية وبلغ عددها 6 حالات

جدول 14ب: معدّل الوفاة (لكل 100,000 من السكان) حسب سبب الوفاة والجنسية والعنات العمرية،
2012 (يتبع)

غير المواطنين						سبب الوفاة
60+	59-45	44-30	29-15	14-0	الإجمالي	
508	551	453	263	170	1,945	العدد الإجمالي لحالات الوفاة*
معدّل الوفيات لكل 100,000 من السكان						
1816.6	251.6	63.1	38.7	79.9	104.7	العدد الإجمالي للحالات
751.0	126.0	30.1	11.5	7.5	42.8	أمراض القلب والأوعية الدموية
42.9	28.8	16.0	17.5	12.2	18.0	الأسباب الخارجية للاعتلال والوفاة
497.1	51.1	5.7	2.1	5.6	17.1	الأورام السرطانية
110.9	3.7	0.8	0.3	3.3	2.9	أمراض الجهاز التنفسي
157.3	9.1	3.6	2.4	3.3	6.1	أعراض وعلامات سريرية غير مصنّفة في مكان آخر
0.0	8.2	3.2	2.4	0.9	3.2	الإصابة والتسمّم وغيرها من الأسباب الخارجية
46.5	5.0	0.6	0.3	2.8	1.9	الغدد الصماء وأمراض التغذية والأبيض
0.0	0.0	0.0	0.0	17.4	2.0	بعض الظروف الناشئة في فترة ما حول الولادة
75.1	7.3	0.6	0.6	2.3	2.7	بعض الأمراض المعدية والطفيلية
0.0	0.0	0.1	0.1	17.9	2.2	التشوّهات الخلقية والتشوهات الصبغية
46.5	6.9	1.0	0.3	0.9	2.1	أمراض الجهاز الهضمي
50.1	1.8	0.6	0.0	0.0	1.2	أمراض الجهاز التناسلي
10.7	1.4	0.3	1.0	0.9	0.9	أمراض الجهاز العصبي
7.2	0.5	0.0	0.0	2.8	0.5	أمراض الدم والأعضاء التي تكوّن الدم واضطرابات المناعة
10.7	1.4	0.1	0.3	0.0	0.5	أمراض الجهاز العضلي والأنسجة الضامة
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	أمراض الجلد والأنسجة تحت الجلد
0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.1	أمراض الحمل والولادة
3.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.1	أمراض الأذن وعملية الخشاء
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	أمراض العين وملحقاتها
7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	الاضطرابات النفسية والسلوكية
0.0	0.0	0.1	0.0	1.9	0.3	غير مبيّن

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي، وهيئة الصحة - أبوظبي.

* تم استبعاد الحالات غير مبيّنة الجنسية ويبلغ عددها 3 حالات

جدول 14ج: معدّل الوفاة (لكل 100,000 من السكان) حسب سبب الوفاة والجنسية والفئات العمرية، 2012
(يتبع)

المواطنون وغير المواطنين						سبب الوفاة
60+	59-45	44-30	29-15	14-0	الإجمالي	
996	692	523	371	339	2,921	العدد الإجمالي لحالات الوفاة *
معدّل الوفيات لكل 100,000 من السكان						
2219.5	271.3	64.5	44.8	85.5	125.1	العدد الإجمالي للحالات
922.6	131.3	30.1	12.1	10.3	48.6	أمراض القلب والأوعية الدموية
49.0	31.0	15.8	21.2	11.8	19.3	الأسباب الخارجية للاعتلال والوفاة
532.6	58.0	5.9	2.5	4.5	20.3	الأورام السرطانية
213.9	4.3	1.5	0.6	2.5	5.7	أمراض الجهاز التنفسي
178.3	8.2	3.3	2.1	3.3	6.8	أعراض وعلامات سريرية غير مصنّفة في مكان آخر
2.2	7.8	3.5	2.9	1.8	3.4	الإصابة والتسمّم وغيرها من الأسباب الخارجية
64.6	5.5	0.6	0.5	2.8	2.7	الغدد الصماء وأمراض التغذية والأبيض
0.0	0.0	0.0	0.0	17.6	3.0	بعض الظروف الناشئة في فترة ما حول الولادة
84.7	8.6	0.6	0.7	3.0	3.6	بعض الأمراض المعدية والطفيلية
0.0	0.0	0.1	0.4	20.4	3.6	التشوهات الخَلْقِيَّة والتشوهات الصغية
44.6	9.8	1.2	0.2	1.0	2.6	أمراض الجهاز الهضمي
80.2	3.1	0.6	0.1	0.5	2.2	أمراض الجهاز التناسلي
26.7	1.2	0.6	1.3	1.5	1.6	أمراض الجهاز العصبي
4.5	0.4	0.0	0.0	1.5	0.4	أمراض الدم والأعضاء التي تكوّن الدم واضطرابات المناعة
8.9	1.6	0.1	0.2	0.3	0.5	أمراض الجهاز العضلي والأنسجة الضامة
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	أمراض الجلد والأنسجة تحت الجلد
0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	أمراض الحمل والولادة
2.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	أمراض الأذن وعملية الخشاء
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	أمراض العين وملحقاتها
4.5	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	الاضطرابات النفسية والسلوكية
0.0	0.0	0.1	0.0	2.5	0.5	غير مبيّن

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي، وهيئة الصحة - أبوظبي.
*تم استبعاد الحالات غير مبيّنة الجنسية أو الجنس ويبلغ عددها 11 حالات.

جدول 15: معدّل وفيات السرطان (لكل 100,000 من السكان) حسب النوع والجنسية،
2012 - 2009

النوع/الجنسية	2009	2010	2011	2012
العدد الإجمالي لوفيات السرطان	390	447	403	406
معدّل الوفاة (لكل 100,000 من السكان)				
الذكور	21.1	16.6	15.3	12.9
المواطنون	41.7	39.5	34.9	30.4
غير المواطنين	16.1	12.2	11.8	9.8
الإناث	28.5	37.1	28	28.4
المواطنات	38.4	42.6	27.3	26.5
غير المواطنات	23.3	33.6	28.4	29.4
الإجمالي	23.7	22.7	19	17.4
المواطنون	40.1	41	31.2	28.5
غير المواطنين	18.3	17.4	15.8	14.5

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي، وهيئة الصحة - أبوظبي.

جدول 16أ: نسبة الإصابة بالأمراض المعدية حسب نوع المرض والجنسية والفئات العمرية، 2012

المواطنون						نوع المرض
65+	64-55	54-35	34-15	14-0	الإجمالي	
55	61	232	770	4,027	5,145	العدد الإجمالي للحالات*
100	100	100	100	100	100	الإجمالي (%)
9.1	4.9	12.1	32.9	76.2	65.2	الجديري المائي
1.8	0.0	0.4	0.4	0.0	0.1	الملاريا
14.5	21.3	17.2	13.2	0.0	3.2	التهاب الكبد الفيروسي (ب)
16.4	19.7	19.4	1.7	0.0	1.5	التهاب الكبد الفيروسي (ج)
9.1	3.3	7.8	4.5	0.8	1.8	الجرب
10.9	3.3	6.5	9.7	9.0	8.9	تسمم غذائي آخر
12.7	14.8	2.2	1.6	0.0	0.6	الدرن الرئوي
1.8	0.0	0.4	2.2	0.1	0.5	حمى التيفود
0.0	1.6	8.2	7.8	0.0	1.6	أمراض أخرى منقولة جنسياً
5.5	4.9	4.7	4.0	2.4	2.8	الإنفلونزا
0.0	0.0	0.9	0.4	1.1	1.0	النكاف
0.0	0.0	0.0	2.9	2.1	2.0	التهاب الكبد الفيروسي (أ)
1.8	3.3	1.3	1.2	0.0	0.3	الدرن غير الرئوي
0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	1.9	الحمى القرمزية
0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.6	السعال الديكي (الشاهوق)
0.0	1.6	0.9	2.3	0.0	0.4	السيلان
1.8	1.6	3.0	0.5	0.0	0.3	الزهري (السفلس)
0.0	0.0	0.4	0.5	0.3	0.3	الجيارديا
1.8	3.3	7.3	2.5	0.7	1.3	داء البروسيلات
0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.3	الحصبة
1.8	0.0	0.0	0.8	0.5	0.5	التهاب السحايا الفيروسي
0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	التهاب كبدي فيروسي آخر
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	الحصبة الألمانية
0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	الشلل الرخوي الحاد
1.8	1.6	1.3	0.1	0.1	0.2	التهاب الدماغ الحاد
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	التتانوس
9.1	14.8	6.0	10.5	2.8	4.3	أمراض أخرى

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي، وهيئة الصحة - أبوظبي.

جدول 16ب: نسبة الإصابة بالأمراض المعدية حسب نوع المرض والجنسية والفئات العمرية، 2012 (بتبع)

نوع المرض	غير المواطنين					الإجمالي	العدد الإجمالي للحالات* الإجمالي (%)
	65+	64-55	54-35	34-15	14-0		
الجديري المائي	3.4	10.0	25.3	41.1	71.6	40.0	
الملاريا	10.3	29.9	27.3	26.6	1.5	16.6	
التهاب الكبد الفيروسي (ب)	13.8	9.7	6.8	3.9	0.1	3.1	
التهاب الكبد الفيروسي (ج)	24.1	18.8	8.2	2.0	0.0	2.8	
الجرب	3.4	5.6	6.6	5.6	1.9	4.1	
تسمم غذائي آخر	3.4	2.9	4.1	3.4	7.7	4.2	
الدرن الرئوي	8.6	3.5	3.0	3.2	0.1	1.9	
حمى التيفود	1.7	2.9	3.9	3.6	1.3	2.6	
أمراض أخرى منقولة جنسياً	0.0	0.0	0.5	0.6	0.0	0.3	
الإنفلونزا	8.6	1.8	1.7	0.7	1.1	0.9	
النكاف	0.0	0.0	0.9	0.8	1.7	0.9	
التهاب الكبد الفيروسي (أ)	0.0	0.6	0.3	0.9	2.5	1.1	
الدرن غير الرئوي	5.2	1.8	1.6	1.8	0.1	1.1	
الحمى القرمزية	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.6	
السعال الديكي (الشاهوق)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	
السيلان	1.7	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	
الزهري (السفلس)	0.0	1.2	1.4	0.5	0.0	0.5	
الجيارديا	1.7	1.2	1.0	0.6	0.4	0.5	
داء البروسيلات	1.7	1.8	0.6	0.5	0.2	0.4	
الحصبة	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.2	
التهاب السحايا الفيروسي	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.2	
التهاب كبد فيروسي آخر	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.1	
الحصبة الألمانية	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	
الشلل الرخوي الحاد	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	
التهاب الدماغ الحاد	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	
التتانوس	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
أمراض أخرى	12.1	8.2	6.2	3.3	5.1	4.0	

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي، وهيئة الصحة - أبوظبي.

جدول 16ج: نسبة الإصابة بالأمراض المعدية حسب نوع المرض والجنسية والفئات العمرية، 2012 (يتبع)

نوع المرض	المواطنون وغير المواطنين					الإجمالي	العدد الإجمالي للحالات *
	65+	64-55	54-35	34-15	14-0		
	113	402	3,173	7,287	8,290	19,265	
	100	100	100	100	100	100	
الجديري المائي	6.2	9.2	24.4	40.2	73.8	51.2	
الملاريا	6.2	25.4	25.3	23.8	0.8	14.1	
التهاب الكبد الفيروسي (ب)	14.2	11.4	7.6	4.9	0.0	3.5	
التهاب الكبد الفيروسي (ج)	20.4	18.9	9.0	1.9	0.0	2.7	
الجرب	6.2	5.2	6.7	5.5	1.4	3.9	
تسمم غذائي آخر	7.1	3.0	4.3	4.1	8.3	5.9	
الدرن الرئوي	10.6	5.2	2.9	3.0	0.1	1.8	
حمى التيفود	1.8	2.5	3.7	3.5	0.7	2.3	
أمراض أخرى منقولة جنسياً	0.0	0.2	1.1	1.4	0.0	0.7	
الإنفلونزا	7.1	2.2	1.9	1.1	1.7	1.5	
النكاف	0.0	0.0	0.9	0.8	1.4	1.0	
التهاب الكبد الفيروسي (أ)	0.0	0.5	0.3	1.1	2.3	1.4	
الدرن غير الرئوي	3.5	2.0	1.5	1.7	0.1	1.0	
الحمى القرمزية	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	1.0	
السعال الديكي (الشاهوق)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.3	
السيلان	0.9	0.2	0.3	0.4	0.0	0.2	
الزهري (السفلس)	0.9	1.2	1.5	0.5	0.0	0.5	
الجيارديا	0.9	1.0	0.9	0.5	0.3	0.5	
داء البروسيلات	1.8	2.0	1.1	0.7	0.5	0.7	
الحصبة	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.3	
التهاب السحايا الفيروسي	0.9	0.0	0.2	0.2	0.4	0.3	
التهاب كبدي فيروسي آخر	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.1	
الحصبة الألمانية	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	
الشلل الرخوي الحاد	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	
التهاب الدماغ الحاد	0.9	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	
التتانوس	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
أمراض أخرى	10.6	9.2	6.2	4.1	4.0	4.5	

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي، وهيئة الصحة - أبوظبي.
*تم استبعاد الحالات غير مبيّنة العمر ويبلغ عددها 3 حالات.

جدول 17: معدّل الإصابة (لكل 100,000 من السكان) بالأمراض المعدية حسب نوع المرض والجنسية والفئات العمرية، 2012

نوع المرض	المواطنون					معدّل الإصابة لكل 100,000 من السكان
	65+	64-55	54-35	34-15	14-0	
الجديري المائي	48.5	19.1	36.7	132.9	1668.0	704.0
الملاريا	9.7	0.0	1.3	1.6	0.0	1.0
التهاب الكبد الفيروسي (ب)	77.6	82.6	52.4	53.6	0.5	34.4
التهاب الكبد الفيروسي (ج)	87.3	76.3	58.9	6.8	0.0	16.6
الجرب	48.5	12.7	23.6	18.4	17.9	19.5
تسمّم غذائي آخر	58.2	12.7	19.6	39.4	196.9	96.5
الدرن الرئوي	67.9	57.2	6.5	6.3	0.0	6.9
حمى التيفود	9.7	0.0	1.3	8.9	3.3	5.2
أمراض أخرى منقولة جنسياً	0.0	6.4	24.9	31.5	0.0	16.8
الإنفلونزا	29.1	19.1	14.4	16.3	52.2	30.2
النكاف	0.0	0.0	2.6	1.6	23.9	10.3
التهاب الكبد الفيروسي (أ)	0.0	0.0	0.0	11.6	45.1	22.0
الدرن غير الرئوي	9.7	12.7	3.9	4.7	1.1	3.6
الحمى القرمزية	0.0	0.0	0.0	0.0	53.3	20.6
السعال الديكي (الشاهوق)	0.0	0.0	0.0	0.0	16.9	6.5
السيلان	0.0	6.4	2.6	9.5	0.5	4.6
الزهري (السفلس)	9.7	6.4	9.2	2.1	0.0	2.7
الجيارديا	0.0	0.0	1.3	2.1	6.5	3.6
داء البروسيلات	9.7	12.7	22.3	10.0	16.3	14.5
الحصبة	0.0	0.0	0.0	0.5	8.2	3.4
التهاب السحايا الفيروسي	9.7	0.0	0.0	3.2	10.9	5.7
التهاب كبدي فيروسي آخر	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.2
الحصبة الألمانية	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.4
الشلل الرخوي الحاد	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	1.3
التهاب الدماغ الحاد	9.7	6.4	3.9	0.5	2.7	2.3
التتانوس	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
أمراض أخرى	48.5	57.2	18.3	42.5	61.5	46.6

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي، وهيئة الصحة - أبوظبي.

جدول 17ب: معدّل الإصابة (لكل 100,000 من السكان) بالأمراض المعدية حسب نوع المرض والجنسية والفئات العمرية، 2012 (يتبع)

نوع المرض	غير المواطنين					الإجمالي	معدّل الإصابة لكل 100,000 من السكان
	65+	64-55	54-35	34-15	14-0		
الجديري المائي	17.8	58.4	129.3	268.2	1434.9	350.7	
الملاريا	53.5	175.1	139.1	173.5	31.0	145.9	
التهاب الكبد الفيروسي (ب)	71.3	56.6	34.9	25.6	1.4	27.0	
التهاب الكبد الفيروسي (ج)	124.8	109.9	41.6	12.8	0.9	24.1	
الجرب	17.8	32.6	33.8	36.8	38.1	35.8	
تسمّم غذائي آخر	17.8	17.2	21.0	22.4	154.6	36.9	
الدرن الرئوي	44.6	20.6	15.1	20.7	2.8	17.1	
حمى التيفود	8.9	17.2	20.0	23.6	26.3	22.5	
أمراض أخرى منقولة جنسياً	0.0	0.0	2.8	3.9	0.5	3.0	
الإنفلونزا	44.6	10.3	8.5	4.6	22.6	8.3	
النكاف	0.0	0.0	4.3	5.2	33.8	8.0	
التهاب الكبد الفيروسي (أ)	0.0	3.4	1.4	5.6	50.7	9.4	
الدرن غير الرئوي	26.7	10.3	8.0	11.5	2.3	9.4	
الحمى القرمزية	0.0	0.0	0.0	0.0	48.4	5.5	
السعال الديكي (الشاهوق)	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	1.2	
السيلان	8.9	0.0	1.2	1.4	0.0	1.2	
الزهري (السفلس)	0.0	6.9	6.9	3.0	0.5	4.0	
الجيارديا	8.9	6.9	5.0	3.6	7.5	4.6	
داء البروسيلات	8.9	10.3	3.3	3.1	4.2	3.6	
الحصبة	0.0	0.0	0.2	0.8	14.6	2.2	
التهاب السحايا الفيروسي	0.0	0.0	1.0	0.9	4.7	1.3	
التهاب كبدي فيروسي آخر	0.0	1.7	0.0	1.2	0.0	0.7	
الحصبة الألمانية	0.0	0.0	0.3	1.1	1.4	0.9	
الشلل الرخوي الحاد	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.8	
التهاب الدماغ الحاد	0.0	0.0	0.5	0.8	1.9	0.8	
التتانوس	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	
أمراض أخرى	62.4	48.1	31.7	21.6	102.4	35.1	

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي، وهيئة الصحة - أبوظبي.

جدول 17ج: معدّل الإصابة (لكل 100,000 من السكان) بالأمراض المعدية حسب نوع المرض والجنسية والفئات العمرية، 2012 (يتبع)

نوع المرض	المواطنون وغير المواطنين					معدّل الإصابة لكل 100,000 من السكان
	65+	64-55	54-35	34-15	14-0	
الجديري المائي	32.5	50.0	118.4	246.6	1542.9	422.8
الملاريا	32.5	137.9	123.0	146.0	16.6	116.3
التهاب الكبد الفيروسي (ب)	74.3	62.2	36.9	30.1	1.0	28.5
التهاب الكبد الفيروسي (ج)	106.8	102.7	43.7	11.9	0.5	22.6
الجرب	32.5	28.4	32.6	33.9	28.7	32.5
تسمّم غذائي آخر	37.2	16.2	20.8	25.1	174.2	49.1
الدرن الرئوي	55.7	28.4	14.1	18.4	1.5	15.0
حمى التيفود	9.3	13.5	17.8	21.3	15.6	19.0
أمراض أخرى منقولة جنسياً	0.0	1.4	5.4	8.3	0.3	5.8
الإنفلونزا	37.2	12.2	9.2	6.5	36.3	12.8
النكاف	0.0	0.0	4.1	4.6	29.2	8.5
التهاب الكبد الفيروسي (أ)	0.0	2.7	1.2	6.6	48.1	12.0
الدرن غير الرئوي	18.6	10.8	7.5	10.4	1.8	8.2
الحمى القرمزية	0.0	0.0	0.0	0.0	50.7	8.6
السعال الديكي (الشاهوق)	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	2.3
السيلان	4.6	1.4	1.4	2.7	0.3	1.9
الزهري (السفلس)	4.6	6.8	7.2	2.9	0.3	3.8
الجيارديا	4.6	5.4	4.6	3.4	7.1	4.4
داء البروسيلات	9.3	10.8	5.5	4.2	9.8	5.8
الحصبة	0.0	0.0	0.2	0.8	11.6	2.4
التهاب السحايا الفيروسي	4.6	0.0	0.9	1.3	7.6	2.2
التهاب كبدي فيروسي آخر	0.0	1.4	0.0	1.1	0.0	0.6
الحصبة الألمانية	0.0	0.0	0.3	0.9	1.3	0.8
الشلل الرخوي الحاد	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.9
التهاب الدماغ الحاد	4.6	1.4	0.9	0.8	2.3	1.1
التتانوس	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1
أمراض أخرى	55.7	50.0	30.2	25.0	83.4	37.4

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي، وهيئة الصحة - أبوظبي.

جدول 18: إخطارات الأمراض المعدية، 2005، 2009-2012

2012	2011	2010	2009	2005	الأمراض المعدية المجموع
19,268	20,295	14,322	13,355	12,345	
9,872	11,768	7,429	7,219	6,307	الجديري المائي
2,715	2,731	1,415	1,393	570	الملاريا
665	673	711	518	384	التهاب الكبد الفيروسي (ب)
527	580	668	479	191	التهاب الكبد الفيروسي (ج)
758	585	654	495	42	الجرب
1147	667	471	309	111	تسمم غذائي آخر
350	383	450	192	239	الدرن الرئوي
443	394	335	133	45	حمى التيفود
136	243	318	65	51	أمراض أخرى منقولة جنسياً
298	282	248	0	53	الإنفلونزا
198	194	221	200	117	النكاف
279	138	193	181	186	التهاب الكبد الفيروسي (أ)
192	183	175	79	0	الدرن غير الرئوي
201	239	105	175	71	الحمى القرمزية
0	0	90	0	0	تسمم السالمونيلا آخر
53	39	73	40	10	السعال الديكي (الشاهوق)
88	99	62	145	335	الزهري (السفلس)
44	42	62	27	25	السيلان
103	82	55	36	863	الجيارديا
135	75	52	45	28	داء البروسيلات
0	0	51	52	32	الزحار الباسيلي
56	49	50	34	18	الحصبة
52	37	36	0	76	التهاب السحايا الفيروسي
14	1	26	12	0	التهاب كبدي فيروسي آخر
18	42	22	48	23	الحصبة الألمانية
0	0	12	30	15	البارتيفويد
21	15	11	11	14	الشلل الرخوي الحاد
26	10	10	10	6	التهاب الدماغ الحاد
2	3	1	3	0	التتانوس
0	0	1	36	5	ديدان البلهارسيا
0	0	0	0	0	أمراض الجهاز الهضمي - بكتيريا الإسهال
0	0	0	205	105	تسمم السالمونيلا
0	0	0	0	0	التسمم الغذائي بالمكورات العنقودية
0	0	0	0	1	الحمى المخية الشوكية
0	0	0	0	0	التهاب السحايا الناجم عن المستدمية النزلية
0	0	0	24	15	التهاب سحائي بكتيري آخر
0	0	0	33	0	التهاب السحايا الفيروسي العقيم
0	0	0	0	3	الجذام
0	0	0	0	2	الكوليرا
0	0	0	951	0	الإنفلونزا الموسمية
0	0	0	0	1,037	داء الأسكاريس (الصفير)
0	0	0	123	0	الزحار البكتيري
0	0	0	0	470	الزحار الأميبي
0	0	0	0	193	الإنكلستوما
0	0	0	0	6	العدوى الناجمة عن المكورات الرئوية السبحية
0	0	0	0	672	الطفيليات المعوية الأخرى
875	741	315	52	24	أمراض أخرى

المصدر: هيئة الصحة - أبوظبي.

جدول 19: المتبرعون بالدم والوحدات المتبرّع بها حسب الفصيلة، 2008-2012

2012	2011	2010	2009	2008	
26,819	094,27	25,850	24,758	21,834	المتبرّعون
5,077	3,794	4,240	4,116	3,832	المواطنون
21,742	23,300	21,610	20,642	18,002	غير المواطنين
الوحدات التي تمّ التبرّع بها حسب النوع					
26,819	27,094	25,850	24,758	22,379	الإجمالي
10,279	10,141	9,441	8,960	8,314	+ O
5,670	6,704	6,620	1,430	5,840	+ A
5,364	5,740	5,423	6,421	4,294	+ B
1,555	1,767	1,727	705	1,302	+ AB
1,501	1,310	1,274	5,130	1,346	- O
705	706	711	483	667	- A
576	575	521	1,493	501	- B
134	151	133	136	115	- AB

المصدر: هيئة الصحة - أبوظبي.

الملاحظات التوضيحية

المصطلحات

تحتوي هذه النشرة على بعض المصطلحات الإحصائية بما يشمل التالي:

عيادة

هي مرفق للرعاية الصحية يضمّ عيادة واحدة أو أكثر يعمل فيها طبيب عام (واحد أو أكثر)، أو أخصائي (واحد أو أكثر). يجب أن تستخدم أي عيادة أساس إجراء الاستشارات الصحية والعلاج البسيط. لا توفر العيادة خدمات الطوارئ ولكن تقدّم خدمات الإسعافات الأولية.

مركز صحي

هو مرفق للرعاية الصحية يعمل كعيادة متعدّدة التخصصات ويوفر خدمات الدعم مثل المختبر والأشعة. ولا تقدّم المراكز الصحية خدمات الطوارئ.

مستشفى

هو مرفق صحي يقع في مبنى مستقل حيث يمكن إيداع المرضى لمدة 24 ساعة أو أكثر ويستخدم المستشفى عند علاج الأمراض والإصابات والتشوّهات، واعتلال الحالة الجسدية أو النفسية، وحالات الأمومة ودور الحضانة والمستوصفات.

الحالة

الحالة هي كل زيارة للمرضى المقيمين او عدد من الزيارات مرتبطة بالحالة العيادية بالنسبة للمريض (التي تحدد عن طريق رقم الضمان الصحي الخاص بالمريض).

المرضى النزل

هو الدخول الرسمي للمريض لتلقّي خدمات المرضى الداخليين في المستشفى.

المريض الخارجي

هو مريض يتلقّى العلاج في المستشفى ولكن لم يتم إدخاله بها.

معدل الإصابة

يشير هذا المعدّل إلى الحالات الجديدة من العدوى بالأمراض المعدية في منطقة معينة وخلال فترة زمنية محددة.

معدّل الانتشار

يشير هذا المعدّل إلى حالات مرض محدّد موجودة في منطقة معينة وخلال فترة زمنية محدّدة.

مصادر البيانات

تمّ الحصول على البيانات من وزارة الصحة وهيئة الصحة - أبوظبي. تتم معالجة البيانات وتمريدها إلى مركز الإحصاء - أبوظبي لمزيد من التحليل.

الاختصارات المستخدمة

SCAD: مركز الإحصاء - أبوظبي.

HAAD: هيئة الصحة - أبوظبي.

MOH: وزارة الصحة، دولة الإمارات العربية المتحدة.

n.a: غير متوفر.

الملاحظات الفنية

حساب المعدّلات والنسب

المعدّل	طريقة الحساب
معدّل الوفيات	$\frac{\text{عدد الوفيات في كل فئة عمرية حسب النوع والجنسية خلال السنة التقويمية} * 100000}{\text{عدد السكان حسب العمر/النوع/الجنسية لكل مجموعة سكانية في 30 يونيو من كل عام}}$
معدّل الإصابة "الحدوث"	$\frac{\text{عدد الحالات المبلّغ عنها حسب العمر والجنسية في السنة التقويمية} * 100000}{\text{عدد السكان لكل فئة عمرية حسب العمر/النوع/الجنسية لكل مجموعة سكانية في 30 يونيو من كل عام}}$

ويستند سبب الوفاة إلى ICD9 – التصنيف الدولي للأمراض.

ملاحظات حول الجداول

وتستند التغييرات (المستويات والنسبة المئوية) في الجداول جميعها إلى الأرقام المقرّبة. قد لا تتساوى النتائج الكليّة في بعض الجداول بسبب التقريب.

الرموز المستخدمة

" < 100 % " معدّل التغيّر يتجاوز 100 في المئة.

مزيد من المعلومات والإصدار المقبل

للمزيد من المعلومات حول الإحصاءات الصحية والإحصاءات الرسمية الأخرى، يرجى زيارة رابط الإحصاءات على موقع مركز الإحصاء الإلكتروني: <http://www.scad.ae>

من المتوقع ظهور الإصدار المقبل في نوفمبر 2014 لبيانات عام 2013.

